

КАТАЛОГ ЯРИХ КУЛЬТУР



SAATBAU
Saat gut, Ernte gut.



PROBSTDORFER
SAATZUCHT

SAATBAU PROBSTDORFER UKRAINE: ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ У СЕЛЕКЦІЇ ТА ВИРОБНИЦТВІ НАСІННЯ

Ласкаво просимо у майбутнє сільського господарства – Ваш продуктивний каталог! Сільське господарство змінюється – і разом з ним змінюються вимоги до високопродуктивного, стійкого та надійного насіння. Ми – не просто насіннева компанія, а рушійна сила сучасного, перспективного сільського господарства.

Наші корені – в практиці: від аграріїв і для аграріїв. Наші знання походять безпосередньо з полів, наші сорти перевірені та вдосконалені досвідченими практиками. Ми пропонуємо не просто насіння – ми пропонуємо рішення для підвищення врожайності, стійкості культур і довготривалого збереження родючості ґрунтів.

Чому саме наше насіння?

- Сорти, перевірені на практиці – Розроблені та протестовані для специфічних умов вашого регіону
- Інновації зустрічаються з досвідом – Вирощено за допомогою найсучасніших технологій, перевірено справжніми аграріями
- Консультації з доданою вартістю – Не просто продаж – ми супроводжуємо вас експертними знаннями та практичним досвідом

SAATBAU PROBSTDORFER UKRAINE є частиною потужного партнерства:

- **SAATBAU LINZ eGen** – Одна з найбільших сільськогосподарських кооперативів Австрії, що об'єднує понад 3 200 фермерів
- **PROBSTDORFER SAATZUCHT** – Провідне приватне селекційне підприємство з сильним фокусом на Центральну та Східну Європу



Це партнерство об'єднує інноваційну потужність сучасного селекційного підприємства з багаторічним сільськогосподарським досвідом – що означає сорти, ідеально адаптовані до ваших потреб.

Наш асортимент – більше, ніж просто насіння!

Ми пропонуємо широкий вибір культур для вашого сівозмінного циклу:



Кукурудза – Висока врожайність і швидка віддача вологи



Соняшник – Високий вміст олії та продуктивність



Соя – Економічно вигідне джерело білка



Зернові – Пшениця, тверда пшениця, ячмінь – адаптовані до регіональних умов



Сидеральні культури – Покращення ґрунту та стійкі сівозмінні системи

Ваша перевага – більше, ніж просто продукт

- Ми пропонуємо не тільки насіння – ми надаємо знання. Наша команда консультантів має доступ до багаторічного практичного досвіду Австрії та України, щоб надати вам найкращу підтримку.
- Кожен сорт – це інвестиція у ваше майбутнє. Наша селекція базується на десятиліттях наукових досліджень і перевірених практик.
- Ставайте частиною сильної спільноти. Наш досвід та відданість спрямовані на довгостроковий успіх.
- Готові до нової ери сільського господарства?

Ознайомтеся з нашим асортиментом – розробленим аграріями для аграріїв!



ЗМІСТ

АСОРТИМЕНТ ГІБРИДІВ

КУКУРУДЗИ	6
МАРКАМО (ФАО 170)	7
АЛЕТТО (ФАО 240)	8
АМЕЛЛО (ФАО 240)	9
РІБЕЛО (ФАО 240)	10
МАГНАТО (ФАО 240)	11
АТЛАНТИКО (ФАО 250)	12
КАСАНДРО (ФАО 250)	13
ЛІГАТО (ФАО 250)	14
ДАНУБІО (ФАО 260)	15
ТАЛЕНТРО (ФАО 260)	16
АЛЬБІРЕО (ФАО 260)	17
ЕГІДІО (ФАО 260)	18
ФІЛМЕНО (ФАО 280)	19
КОРОНАДО (ФАО 290)	20
КОРПО (ФАО 310)	21
АЛЕНАРО (ФАО 320)	22
ПРОФУНДО (ФАО 330)	23
АРТЕНІО (ФАО 340)	24
АРКАДІО (ФАО 350)	25
СИЛЬВАНЕР (ФАО 350)	26
КАРІБІКО (ФАО 370)	27
АРСАНТТО (ФАО 370)	28
СОЛІТАРО (ФАО 380)	29
ТЕРРІО (ФАО 390)	30

АСОРТИМЕНТ ГІБРИДІВ

СОНЯШНИКА	32
ХЕЛЕСАН СУ	33
СОФІЯСОЛ	34
СТАРФАЕР	35
КС 108	36
ІРІНАСОЛ	37
АРУНАСАН ІР	38
ФЛОРАСАН	39
КАРРЕРА КЛП	40

АСОРТИМЕНТ СОРТІВ СОЇ 42

АМБЕЛЛА	43
АДЕССА	44

АБАКА	45
АУРЕЛІНА	46
АЛІСІЯ	47
АДЕЛЬФІЯ	48
АКАРДІЯ	49
АХІЛЕА	50
АПОЛЛІНА	51
АБІОЛА	52
АТАКАМА	53
АЛЬВЕСТА	54
АНГЕЛІКА	55

ЯРІ КУЛЬТУРИ: ГОРОХ, ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ, РІПАК, ОВЕС, ЛЮЦЕРНА, ГАРБУЗ

ГОРОХ ЛЮМП	58
ГОРОХ ВЕЛЬВЕТ	59
М'ЯКА ЯРА ПШЕНИЦЯ ГРЕННІ	60
М'ЯКА ЯРА ПШЕНИЦЯ	
ПАТРІЦІЯ (ДВОРУЧКА)	61
ТВЕРДА ЯРА ПШЕНИЦЯ ВІДЕОДУР	62
ТВЕРДА ЯРА ПШЕНИЦЯ ТАМАДУР	63
ТВЕРДА ЯРА ПШЕНИЦЯ ДУРОФІНУС	64
ЯРИЙ ЯЧМІНЬ ВІЛЬМА	65
ЯРИЙ РІПАК КЛЕОПАТРА	66
ЛЮЦЕРНА ЛА РОККА	67
ОВЕС ПЛАТІН	68
ОЛІЙНИЙ ГАРБУЗ ПАБЛО	69
ОЛІЙНИЙ ГАРБУЗ БЕППО	70
ОЛІЙНИЙ ГАРБУЗ ЕНЦО	71

ТРАВСУМІШІ

BODENFIT	74
NITROFIT	74
WASSERGÜTE FRÜH	75
WASSERGÜTE FEIN	75
FUTTERPROFI EI	76
BIENENTRACHTBRACH	76



ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ



ДОСТАТНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	80-85
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	70-75
НЕДОСТАТНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	55-60



ФАО
240



Високий потенціал урожайності



Гарна вологовіддача



Стабільний в різних кліматичних умовах



Пластичний до технологій вирощування



Відмінна стійкість до ламкості стебла



Рядів зерен:
16–18



Зерен у ряду:
30–34

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ	+7-9 °C
ОПТИМАЛЬНІ	+10-12 °C
ПІЗНІ	13+ °C

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	МАЛОПРИДАТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ	СЕРЕДНЯ ТА ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	75-80
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	65-70
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	50-55



Має високий вміст крохмалю в зерні



Висока стабільність та пластичність до умов вирощування



Чудова толерантність по посухи та інших складних умов



Висока стійкість до вилягання та ламкості стебла



Рядів зерен:
16–18



Зерен у ряду:
34–36

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ	+7-9 °C
ОПТИМАЛЬНІ	+10-12 °C
ПІЗНІ	13+ °C

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● 6 ● ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	СЕРЕДНЬОПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ОПТИМАЛЬНЕ ТА НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	МАЛОПРИДАТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ	СЕРЕДНЯ

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	75-80
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	70-75
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	45-50

ФАО
240



ФАО
240



Дуже високий і стабільний потенціал урожайності зерна



Зерно проміжного типу



Гібрид універсального використання



Висока врожайність сухої речовини



Висока толерантність до посухи



Рядів зерен:
16-18



Зерен у ряду:
34-38

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ	+7-9 °C
ОПТИМАЛЬНІ	+10-12 °C
ПІЗНІ	13+ °C

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	8
ВОЛОГОВІДДАЧА	8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	7
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	8
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	7

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	СЕРЕДНЬОПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	МАЛОПРИДАТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ	СЕРЕДНЯ

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	70-75
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	65-70
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	60-65

ФАО
240



Гарна якість при використанні на силос



Дуже висока врожайність сухої речовини та високий потенціал урожайності зерна



Характеризується високою холодостійкістю, дуже швидкими початковими темпами розвитку та вражаючою висотою рослин



Хороша засвоюваність клітинної стінки та високий вміст крохмалю



Рядів зерен:
16-18



Зерен у ряду:
34-42

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ	+7-9 °C
ОПТИМАЛЬНІ	+10-12 °C
ПІЗНІ	13+ °C

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	9
ВОЛОГОВІДДАЧА	7
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	7
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	8
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	7

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	МАЛОПРИДАТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ	СЕРЕДНЯ ТА ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	70-75
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	65-70
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	55-65

АТЛАНТИКО

Тип зерна: кременисто-зубовидний
Використання: зерно, силос
Група стиглості: середньорання



ФАО
250



Дуже швидкі початкові темпи росту



Високоврожайний гібрид з відмінною якістю зерна



Адаптований до різних ґрунтово-кліматичних зон



Гарна стійкість до хвороб, вилягання та посухи



Рядів зерен:
14-16



Зерен у ряду:
34-38

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ +7-9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ МАЛОПРИДАТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ СЕРЕДНЯ ТА ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ 75-80
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ 60-65
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ 45-50

КАСАНДРО

Тип зерна: кременисто-зубовидний
Використання: зерно, крупа
Група стиглості: середньорання



Відмінна стійкість до посушливих умов



Висока пластичність і непримхливість до умов вирощування



Прекрасна озерненість качана, крупне зерно і склоподібність - ідеально для круп'яної промисловості



Рядів зерен:
16-18



Зерен у ряду:
36-44

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ +7-9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ 13+ °C

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● 9 ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 9 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ ТАК
ІНТЕНСИВНІСТЬ СЕРЕДНЯ ТА ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ 70-75
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ 60-65
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ 45-50

ФАО
250



ФАО
250



Гібрид потрійного використання
зерно, силос, біогаз



Добре підходить для холодних умов, завдяки швидким темпам розвитку в поєднанні з чудовою холодостійкістю



Адаптований до різних ґрунтово-кліматичних умов



Рядів зерен:
14-16



Зерен у ряду:
36-44

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ	+7-9 °C
ОПТИМАЛЬНІ	+10-12 °C
ПІЗНІ	13+ °C

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	9
ВОЛОГОВІДДАЧА	7
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	8
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	9
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	8

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	МАЛОПРИДАТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ	СЕРЕДНЯ ТА ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	75-80
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	65-75
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	50-55



Надійний та стабільний гібрид
універсального використання



Потужно збалансований гібрид екстенсивного типу



Добре зарекомендував себе при вирощуванні на торфових та легких ґрунтах



Має хорошу структуру та скловидність зерна, добре підходить для переробки на крупу



Рядів зерен:
12-14



Зерен у ряду:
36-44

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ	+7-9 °C
ОПТИМАЛЬНІ	+10-12 °C
ПІЗНІ	В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	7
ВОЛОГОВІДДАЧА	7
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	7
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	8
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	7

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	СЕРЕДНЬОПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	МАЛОПРИДАТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ	НИЗЬКА ТА СЕРЕДНЯ

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	70-75
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	60-65
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	50-55

ФАО
260



Ідеальний варіант для екстенсивної технології та легких ґрунтів



Надзвичайно холодостійкий гібрид із дуже швидким початковим розвитком



Виділяється з-поміж інших дуже високою натурою зерна



Рядів зерен:
16–18



Зерен у ряду:
36–42

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ	+7-9 °C
ОПТИМАЛЬНІ	+10-12 °C
ПІЗНІ	13+ °C

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	9
ВОЛОГОВІДДАЧА	8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	8
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	8
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	8

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ОПТИМАЛЬНЕ ТА НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	ТАК
ІНТЕНСИВНІСТЬ	СЕРЕДНЯ

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	70-75
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	55-60
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	45-50

ФАО
260



Завдяки пластичності до кліматичних умов, придатний для всіх умов вирощування



Має хорошу холодостійкість та посухостійкість



Максимально розкриває свій потенціал за інтенсивної технології



Чудова вологовіддача та гарна виповненість качана



Рядів зерен:
16–18



Зерен у ряду:
36–42

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ	+7-9 °C
ОПТИМАЛЬНІ	+10-12 °C
ПІЗНІ	13+ °C

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	8
ВОЛОГОВІДДАЧА	8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	8
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	8
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	8

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	ТАК
ІНТЕНСИВНІСТЬ	ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	75-80
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	60-65
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	50-55



ФАО
270



Вдале поєднання високих показників
врожайності та стабільності



Гібрид має стримані темпи початкового росту
та розвитку



Дуже швидка вологовіддача



Максимально продуктивний за оптимальних
термінів посіву



Рядів зерен:
18–20



Зерен у ряду:
32–36

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ ВІД +9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● 9 ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ ДОСТАТНЄ ТА НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ ТАК
ІНТЕНСИВНІСТЬ СЕРЕДНЯ ТА ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ 70-75
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ 55-60
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ 40-45



Широке вікно збирання завдяки вираженому
ефекту Stay green. Ідеальний на силос



Високий потенціал продуктивності та вихід
сухої речовини (для силосу)



Чудова стійкість до вилягання



Потужний початковий ріст



Надзвичайно висока посухо- та жаростійкість



Рядів зерен:
16–18



Зерен у ряду:
34–38

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ +7-9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● 6 ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА МАЛОПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ МАЛОПРИДАТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ СЕРЕДНЯ ТА ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ 73-78
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ 65-70
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ 52-57

КОРОНАДО

Тип зерна: зубовидний
Використання: зерно
Група стиглості: середньорання

ФАО
290



Флагман продуктивності у своїй групі стиглості



Високий потенціал урожайності



Потужна коренева система



Стійкий до основних стресових факторів, пластичний, пристосовується до різних умов вирощування



Рядів зерен:
16-18



Зерен у ряду:
36-40

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ ВІД +9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● 9 ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	ТАК
ІНТЕНСИВНІСТЬ	ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	68-72
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	55-60
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	45-50

Тип зерна: зубовидний
Використання: зерно
Група стиглості: середньостигла

NEW

КОРПО

ФАО
310



Висока посухо- та жаростійкість



Пластичний гібрид



Висока адаптивність до умов вирощування



Добре виражений Stay green ефект



Рядів зерен:
14-18



Зерен у ряду:
32-36

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ ВІД +9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ 13+ °C

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 9 ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	МАЛОПРИДАТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ	СЕРЕДНЯ ТА ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	70-75
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	60-65
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	45-50



ФАО
320



Чудово переносить посуховий стрес



Низькорослий гібрид



Надзвичайна вирівняність початків



Помірні темпи початкового росту



Відмінне запилення початку



Рядів зерен:
16-18



Зерен у ряду:
30-36

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ ВІД +9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● 5 ● ● ● ● ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● 6 ● ● ● ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	МАЛОПРИДАТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ	СЕРЕДНЯ ТА ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	72-78
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	58-63
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	45-50



Має міцне стебло та чудову стійкість до вилягання



Помірні початкові темпи розвитку



Гібрид подвійного використання



Екстенсивний гібрид



Має чудовий Stay green ефект



Рядів зерен:
16-18



Зерен у ряду:
34-38

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ +7-9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ 13+ °C

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● 5 ● ● ● ● ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	МАЛОПРИДАТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ	СЕРЕДНЯ ТА ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	70-75
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	60-65
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	45-50

ФАО
330





KLIMAFIT

ФАО
340



Дуже швидка вологовіддача



Максимально розкриває потенціал урожайності за інтенсивної технології вирощування



Висока стійкість до вилягання та стресових погодних умов



Добре підходить для вирощування на зрошенні



Рядів зерен:
18-22



Зерен у ряду:
36-40

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ ВІД +9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● 6 ● ● ● ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	ТАК
ІНТЕНСИВНІСТЬ	ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	68-72
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	60-65
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	47-52



Новий потужний гібрид для зон достатнього та нестійкого зволоження



Низькорослий гібрид із міцним стеблом та відмінною стійкістю до вилягання



Забезпечує дуже високі врожаї завдяки високій виповненості качана та збалансованій структурі



Має дуже хорошу натуру зерна



Рядів зерен:
18-20



Зерен у ряду:
34-38

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ ВІД +9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ДОСТАТНЄ ТА НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	ТАК
ІНТЕНСИВНІСТЬ	СЕРЕДНЯ ТА ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	70-75
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	60-65
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	45-50



ФАО
350

СИЛЬВАНЕР

Тип зерна: зубовидний
Використання: зерно
Група стиглості: середньостигла



ФАО
350



Виділяється дуже високою
натурою зерна



Відмінна посухостійкість



Чудова енергія початкового росту



Добре виражений Stay green ефект



Добре підходить для вирощування
на зрошенні



Рядів зерен:
12-14



Зерен у ряду:
38-44

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ ВІД +9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ НЕСТІЙКЕ ТА НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ ТАК
ІНТЕНСИВНІСТЬ СЕРЕДНЯ

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ 70-75
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ 55-60
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ 45-50

КАРІБІКО

Тип зерна: зубовидно-кременистий
Використання: зерно
Група стиглості: середньостигла



Надзвичайно пластичний до технології
вирощування



Чудово збалансований гібрид



Високий і стабільний урожай зерна у зонах
нестійкого зволоження



Відмінна стійкість до вилягання



Рядів зерен:
16-18



Зерен у ряду:
34-38

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ +7-9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ НЕСТІЙКЕ ТА НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ ТАК
ІНТЕНСИВНІСТЬ СЕРЕДНЯ ТА ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ 67-72
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ 58-63
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ 48-53



ФАО
370



ФАО
370



Надзвичайна врожайність у зволжених регіонах



Має чудовий Stay green ефект



Висока толерантність до основних хвороб



Висока стійкість до ламкості стебла



Рядів зерен:
16–20



Зерен у ряду:
34–38

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ ВІД +9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ 13+ °C

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● 5 ● ● ● ● ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● 7 ● ● ● ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	МАЛОПРИДАТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ	СЕРЕДНЯ ТА ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	65-70
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	55-60
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	45-50



Чудова виповненість початку та висока натура зерна



Відмінна жаро- та посухостійкість



Розкриває потенціал за інтенсивної технології вирощування



Має гарну натуру зерна



Рядів зерен:
16–18



Зерен у ряду:
36–38

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ ВІД +9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● 7 ● ● ● ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● 7 ● ● ● ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	МАЛОПРИДАТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ	ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	70-75
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	60-65
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	45-50



ФАО
380

ФАО
390



Високий потенціал урожайності



Чудові початкові темпи розвитку



Висока фіксація качану



Дуже швидкі темпи скидання вологи



Відмінна виповненість зерна



Висока толерантність до основних хвороб



Рядів зерен:
16–18



Зерен у ряду:
38–40

ТЕРМІНИ ПОСІВУ (t ґрунту °C):

РАННІ ВІД +9 °C
ОПТИМАЛЬНІ +10-12 °C
ПІЗНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ВОЛОГОВІДДАЧА	● ● ● ● ● ● ● ● 7 ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 7 ●
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ	● ● ● ● ● ● ● ● 9 ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

МОНОКУЛЬТУРА	ПРИДАТНИЙ
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ	ВСІ
ПІЗНЄ ЗБИРАННЯ	МАЛОПРИДАТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ	ВИСОКА

ГУСТОТА ПОСІВУ:

ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	65-70
НЕСТІЙКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ	55-60
НЕДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ	40-45



ГІБРИДИ
СОНЯШНИКА

СОФІЯСОЛ

РАНЬОСТИГЛИЙ, 105-110 ДНІВ ЛІНОЛЕВИЙ ПІД СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИНИ



Висока толерантність до фомозу та склеротиніозу кошика



Кошик соняшнику має напівопуклу форму, що сприяє рівномірному розподілу насіння та покращує його дозрівання



Поєднує високу висоту рослини з гарною стійкістю до вилягання



Має геном стійкості Plasmopara PL6

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

Зона вирощування	Інтенсивність
всі	середня та висока

ГУСТОТА ПОСІВУ:

Достатнє зволоження	Недостатнє зволоження
55-60 тис. рослин/га	40-45 тис. рослин/га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Нахил кошика:
Наполовину донизу



Стійкість до вовчка:
А-Е



Олійність:
48-51%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● 6 ● ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО	
ФОМОПСИС	● ● ● ● ● 6 ● ● ●
ФОМОЗ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
БІЛА ГНІЛЬ КОШИКА	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
БІЛА ГНІЛЬ СТЕБЛА	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
НЕСПРАВЖНЯ БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● 7 ● ●

NEW СТАРФАЕР

РАНЬОСТИГЛИЙ, 105-110 ДНІВ ЛІНОЛЕВИЙ ПІД СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИНИ



Висока продуктивність за будь-яких умов!



Висока рослина з хорошою стійкістю до вилягання



Висока толерантність до фомозу та склеротиніозу кошика

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

Зона вирощування	Інтенсивність
всі	висока

ГУСТОТА ПОСІВУ:

Достатнє зволоження	Недостатнє зволоження
50-55 тис. рослин/га	40-45 тис. рослин/га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Нахил кошика:
Наполовину донизу



Стійкість до вовчка:
А-Е+



Олійність:
50-55%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● 7 ● ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 9 ●
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО	
ФОМОПСИС	● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ФОМОЗ	● ● ● ● ● ● 8 ● ●
БІЛА ГНІЛЬ КОШИКА	● ● ● ● ● ● 8 ● ●
БІЛА ГНІЛЬ СТЕБЛА	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
НЕСПРАВЖНЯ БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● 7 ● ●

КС108

СЕРЕДНЬОРАННІЙ, 110 ДНІВ

ЛІНОЛЕВИЙ

ПІД СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИНИ



Надійний та стабільний гібрид за будь-яких умов



Пластичний гібрид, невибагливий до умов вирощування



Хороша стійкість до основних хвороб та вилягання

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

Зона вирощування	Інтенсивність
всі	середня

ГУСТОТА ПОСІВУ:

Достатнє зволоження	Недостатнє зволоження
50-55 тис. рослин/га	40-45 тис. рослин/га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Нахил кошика:
Наполовину донизу



Стійкість до вовчка:
А-Е



Олійність:
47-50%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● 6 ● ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО	
ФОМОПСИС	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ФОМОЗ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
БІЛА ГНИЛЬ КОШИКА	● ● ● ● ● ● 8 ●
БІЛА ГНИЛЬ СТЕБЛА	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
НЕСПРАВЖНЯ БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● 7 ● ●

NEW

ІРІНАСОЛ

СЕРЕДНЬОРАННІЙ 110-112 ДНІВ

ЛІНОЛЕВИЙ

ПІД CLEARFIELD



Гарна стійкість до вилягання



Дуже високий потенціал врожайності



Має високу толерантність до таких хвороб як сіра гниль, фомоз, фомопсис, склеротинії кошику та стебла



Стійкий до раси Plasmopara 730 і несе ген плазмопара PLarg

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

Зона вирощування	Інтенсивність
всі	середня та висока

ГУСТОТА ПОСІВУ:

Достатнє зволоження	Недостатнє зволоження
50-55 тис. рослин/га	35-45 тис. рослин/га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Нахил кошика:
Напіввертикальний



Стійкість до вовчка:
А-Е+



Олійність:
47-49%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● 7 ● ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ФОМОПСИС	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ФОМОЗ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
БІЛА ГНИЛЬ КОШИКА	● ● ● ● ● ● 8 ●
БІЛА ГНИЛЬ СТЕБЛА	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
НЕСПРАВЖНЯ БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● 7 ● ●

АРУНАСАН ІР

СЕРЕДНЬОРАННІЙ 110-112 ДНІВ ЛІНОЛЕВИЙ ПІД CLEARFIELD



Дуже високий потенціал врожайності



Гарна стійкість до вилягання



Має високу толерантність до таких хвороб як сіра гниль, фомоз, фомопсис, склеротинії кошику та стебла



Стійкий до раси Plasmopara 730 і несе ген плазмопара PLarg

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

Зона вирощування	Інтенсивність
всі	середня та висока

ГУСТОТА ПОСІВУ:

Достатнє зволоження	Недостатнє зволоження
45-50 тис. рослин/га	35-45 тис. рослин/га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Нахил кошика:
Наполовину донизу



Стійкість до вовчка:
А-Е



Олійність:
50-52%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО	
ФОМОПСИС	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ФОМОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
БІЛА ГНИЛЬ КОШИКА	● ● ● ● ● ● ● ● 9
БІЛА ГНИЛЬ СТЕБЛА	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
НЕСПРАВЖНЯ БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●

ФЛОРАСАН

СЕРЕДНЬОРАННІЙ, 112-115 ДНІВ ЛІНОЛЕВИЙ ПІД ІМІ



Висока стабільність та пластичність за всіх ґрунтово-кліматичних умов



Пластичний гібрид до ступеня інтенсивності технології



Завдяки швидким темпам стартового росту швидко з'єднує рядки, що допомагає ефективніше подолати стрес на початку вегетації

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

Зона вирощування	Інтенсивність
нестійке та недостатнє зволоження	середня та висока

ГУСТОТА ПОСІВУ:

Достатнє зволоження	Недостатнє зволоження
50-55 тис. рослин/га	35-40 тис. рослин/га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Нахил кошика:
Донизу



Стійкість до вовчка:
А-Е



Олійність:
50-52%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО	
ФОМОПСИС	● ● ● ● ● ● ● 6 ● ●
ФОМОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
БІЛА ГНИЛЬ КОШИКА	● ● ● ● ● ● ● ● 9
БІЛА ГНИЛЬ СТЕБЛА	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
НЕСПРАВЖНЯ БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●

КАРРЕРА КЛП

СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ, 116-117ДНІВ

ЛІНОЛЕВИЙ

ПІД CLEARFIELD PLUS



Високопродуктивний та пластичний гібрид інтенсивного типу



Добре реагує на всі елементи інтенсифікації



Хороша стійкість до основних хвороб та вилягання



Має ген стійкості PL 8 Плазмопара (несправжня борошниста роса)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

Зона вирощування	Інтенсивність
всі	середня та висока

ГУСТОТА ПОСІВУ:

Достатнє зволоження	Недостатнє зволоження
50-52 тис.рослин/га	35-40 тис.рослин/га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Нахил кошика:
Наполовину донизу



Стійкість до вовчка:
А-Е



Олійність:
49-52%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● 6 ● ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ФОМОПСИС	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ФОМОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
БІЛА ГНІЛЬ КОШИКА	● ● ● ● ● ● ● ● 9
БІЛА ГНІЛЬ СТЕБЛА	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
НЕСПРАВЖНЯ БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● 8 ●



СОРТИ
СОЇ

Назва сорту	Група стійлості	Днів вегетації	СНУ	Початковий розвиток [1-9]	Тип розвитку	Ступінь гілкування	Стійкість до метрибузину	Густота на момент збирання	Рекомендована ширина міжряддя, см
АМБЕЛЛА	0000+	80-82	2225	8	індетермінантний	низький	стійкий	650-700	12,5-19
АДЕССА КЛІМАЕТ	0000	82-85	2250	8	індетермінантний	від низького до середнього	стійкий	500-650	12,5-25
АБАКА КЛІМАЕТ	000+	93-95	2350	9	індетермінантний	середня	стійкий	450-550	12,5-45
АУРЕЛІНА КЛІМАЕТ	000	95-100	2400	7	індетермінантний	середня	стійкий	450-550	12,5-45
АЛІСІЯ	000	97-101	2425	7	індетермінантний	середня	стійкий	450-500	12,5-45
АКАРДІЯ	000-	98-102	2450	7	індетермінантний	середня	стійкий	420-500	12,5-70
АДЕЛЬФІЯ	000-	98-102	2450	9	напівдетермінантний	від низького до середнього	стійкий	450-550	12,5-35
АХІЛЕА	000-	100-105	2475	7	напівдетермінантний	від низького до середнього	стійкий	550-650	12,5-25
АПОЛЛІНА NEW	000-	100-105	2475	8	індетермінантний	високий	стійкий	380-480	12,5-45
АБЮЛА NEW	00	105-110	2575	8	напівдетермінантний	середня	чутливий	420-520	12,5-45
АТАКАМА	00	110	2625	8	індетермінантний	високий	чутливий	350-450	25-70
АЛЬВЕСТА	00	110-112	2650	7	напівдетермінантний	від низького до середнього	чутливий	500-600	12,5-25
АНГЕЛІКА	00-	112-115	2675	7	індетермінантний	високий	стійкий	350-450	25-70



АМБЕЛЛА

УЛЬТРАРАННЯ [0000+]

СНУ 2225

ДНІ: 80-82



Ідеальний варіант для післяжнивного посіву



Чудова стійкість до вилягання



Характеризується підвищеною адаптивністю до несприятливих умов вирощування



Помірно стійкий до перестою та стійкий до розтріскування бобів



Дуже швидкі темпи росту та розвитку



Висота кріплення нижніх бобів – 12-14 см

Ступінь гілкування	Ширина міжряддя	Густота на час збирання
низький	12,5 – 19 см	650-700 тис/га
Тип росту	Колір квітки	Насіннєвий рубчик
індетермінантний	фіолетовий	темний
Маса тисячі зерен	Вміст протеїну	Олійність
180-200 г	40-42%	20-21%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 9 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 9 ● ●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БАКТЕРІОЗ	● ● ● ● ● ● 6 ● ● ●
ПЕРОНОСПОРОЗ	● ● ● ● ● ● 6 ● ● ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● 7 ● ● ●

АДЕССА

УЛЬТРАРАННЯ [0000]

CHU 2250

ДНІ: 82-85



Флагман ультрараннього сегменту



Сорт сої з високими показниками продуктивності та ранніми термінами дозрівання



Завдяки скоростиглості може використовуватись як попередник для озимих культур



Відрізняється високою толерантністю до хвороб, вилягання та здатністю до гілкування



Підходить для післязнівного посіву

Ступінь гілкування	Ширина міжряддя	Густота на час збирання
від низького до середнього	12,5 – 25 см	500-650 тис/га
Тип росту	Колір квітки	Насінневий рубчик
індетермінантний	фіолетовий	темний
Маса тисячі зерен	Вміст протеїну	Олійність
170-200 г	40-42%	22-24%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БАКТЕРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПЕРОНОСПОРОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●

АБАКА

РАНЬНОСТИГЛА [000+]

CHU 2350

ДНІ: 93-95



Сорту притаманний надзвичайно швидкий стартовий ріст, що дозволяє одразу сформувати чудовий стеблестій та відмінно конкурувати з бур'янами



Висока стабільність та посухостійкість



Завдяки високій толерантності до склеротиніозу, є хорошим варіантом у насиченості сівозміни із інтенсивним вирощуванням сої



Чудово адаптується до вирощування в різних кліматичних умовах

Ступінь гілкування	Ширина міжряддя	Густота на час збирання
середня	12,5 – 45 см	450-550 тис/га
Тип росту	Колір квітки	Насінневий рубчик
індетермінантний	фіолетовий	світлий
Маса тисячі зерен	Вміст протеїну	Олійність
175-205 г	41-43%	20-21%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● ● 9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БАКТЕРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПЕРОНОСПОРОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

АУРЕЛІНА

РАННЬОСТИГЛА [000]

СНУ 2400

ДНІ: 95-100



Сорт, який ламає стереотипи про валовий збір протеїну у групі стиглості 000



Раннє досягання та відмінна врожайність



У посушливі роки демонструє адаптаційну здатність до дефіциту вологи



Крупне зерно та світлий колір рубчика

Ступінь гілкування	Ширина міжряддя	Густота на час збирання
середня	12,5 – 45 см	450-550 тис/га
Тип росту	Колір квітки	Насінневий рубчик
індетермінантний	фіолетовий	світлий
Маса тисячі зерен	Вміст протеїну	Олійність
200-220 г	45-47%	21-22%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● 6 ● ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БАКТЕРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПЕРОНОСПОРОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

АЛІСІЯ

РАННЬОСТИГЛА [000]

СНУ 2425

ДНІ: 97-101



Максимально розкриває потенціал урожайності в регіонах із достатнім зволоженням



Має оптимальне поєднання прибутковості, стабільності врожаю та беззаперечної стійкості до вилягання



Толерантність до склеротиніозу - вище середнього

Ступінь гілкування	Ширина міжряддя	Густота на час збирання
від низького до середнього	12,5 – 45 см	450-500 тис/га
Тип росту	Колір квітки	Насінневий рубчик
індетермінантний	фіолетовий	темний
Маса тисячі зерен	Вміст протеїну	Олійність
190-205 г	41-43%	23-24%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БАКТЕРІОЗ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ПЕРОНОСПОРОЗ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

АДЕЛЬФІЯ

РАНЬОСТИГЛА [000-]

СНУ 2450

ДНІ: 98-102



Максимальне поєднання прибутковості та стабільності врожаю за будь-яких умов



Є лідером серед досліджуваних сортів у випробуваннях країн ЄС та України



Відрізняється швидким початковим розвитком та здатністю до гілкування



Не висока, із великою ярусністю бобів на рослині

Ступінь гілкування	Ширина міжряддя	Густота на час збирання
від низького до середнього	12,5 – 35 см	450-550 тис/га
Тип росту	Колір квітки	Насінневий рубчик
напівдетермінантний	фіолетовий	світлий
Маса тисячі зерен	Вміст протеїну	Олійність
170-210 г	41-43%	20-21%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● ● 9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 9
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БАКТЕРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПЕРОНОСПОРОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

АКАРДІЯ

РАНЬОСТИГЛА [000-]

СНУ 2450

ДНІ: 98-102



Ранній сорт, придатний для широкорядних посівів



Має яскраво виражений Stay green ефект, який триває майже до збору врожаю



Добре справляється з найрізноманітнішими стресовими погодними умовами, тому є стабільною по врожайності



Має помірний стартовий розвиток та не демонструє втрат зерна навіть за несприятливих умов дозрівання



Завдяки добре розвиненій толерантності до склеротинії, чудово почувається у сівозмiнах з високою насиченістю соєю

Ступінь гілкування	Ширина міжряддя	Густота на час збирання
середня	12,5 – 70 см	420-500 тис/га
Тип росту	Колір квітки	Насінневий рубчик
індетермінантний	фіолетовий	світлий
Маса тисячі зерен	Вміст протеїну	Олійність
168-195 г	38-42%	22-24%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БАКТЕРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПЕРОНОСПОРОЗ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

АХІЛЕА

РАНЬОСТИГЛА [000-]

CHU 2475

ДНІ: 100-105



Відмінно реалізує потенціал урожайності за будь-яких умов



Компактний сорт, адаптований для будь-яких регіонів вирощування



Згідно з агрономічними показниками, відрізняється високою стійкістю до вилягання та чудовою стійкістю до розтріскування



Низькоросла рослина, яка має щільну ярусність бобів

Ступінь гілкування	Ширина міжряддя	Густота на час збирання
від низького до середнього	12,5 – 25 см	550-650 тис/га
Тип росту	Колір квітки	Насінневий рубчик
напівдетермінантний	фіолетовий	світлий
Маса тисячі зерен	Вміст протеїну	Олійність
175-205 г	42-43%	21-22%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 9
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БАКТЕРІОЗ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ПЕРОНОСПОРОЗ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● 8 ●

NEW АПОЛЛІНА

РАНЬОСТИГЛА [000+]

CHU 2475

ДНІ: 100-105



Дуже добре поводить себе у регіонах із підвищеною температурою під час формування бобів



Дуже висока врожайність у поєднанні з високим вмістом протеїну – 42-44%



Відмінна стійкість до розтріскування бобів



Завдяки великій зернистості та світлому кольору рубчика добре підходить для харчової промисловості

Ступінь гілкування	Ширина міжряддя	Густота на час збирання
високий	12,5 – 45 см	380-480 тис/га
Тип росту	Колір квітки	Насінневий рубчик
напівдетермінантний	фіолетовий	світлий
Маса тисячі зерен	Вміст протеїну	Олійність
175-205 г	42-44%	21-22%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БАКТЕРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПЕРОНОСПОРОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

АБІОЛА NEW

СЕРЕДНЬОРАННЯ [00]

СНУ 2575

ДНІ: 105-110



Сорт чутливий до діючої речовини метрибузин



Надзвичайно високий вміст протеїну



Жовтий колір рубчика та крупне зерно роблять його ідеальним для харчової сої



Окрім виняткової якості, забезпечує високу врожайність



Поєднує середньо-високу висоту рослин з добрим гілкуванням і покриттям ґрунту, а також має хорошу стійкість до вилягання

Ступінь гілкування	Ширина міжряддя	Густота на час збирання
середня	25-70 см	420-520 тис/га
Тип росту	Колір квітки	Насінневий рубчик
напівдетермінантний	фіолетовий	світлий
Маса тисячі зерен	Вміст протеїну	Олійність
190-220 г	45-47%	19-21%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БАКТЕРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПЕРОНОСПОРОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●

АТАКАМА

СЕРЕДНЬОРАННЯ [00]

СНУ 2625

ДНІ: 110



Сорт чутливий до діючої речовини метрибузин



Високий ступінь гілкування дає можливість вирощувати за широкого міжряддя



Високоврожайний сорт із відмінною стабільністю, реалізовує потенціал у несприятливих умовах



Має виражену посухостійкість і добре підготовлена до стресів різного характеру



Має стримані початкові темпи розвитку та придатна для органічного вирощування

Ступінь гілкування	Ширина міжряддя	Густота на час збирання
високий	25-70 см	350-450 тис/га
Тип росту	Колір квітки	Насінневий рубчик
індетермінантний	фіолетовий	світлий
Маса тисячі зерен	Вміст протеїну	Олійність
170-195 г	40-42%	21-22%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БАКТЕРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ПЕРОНОСПОРОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●

АЛЬВЕСТА

СЕРЕДНЬОРАННЯ [00]

СНУ 2650

ДНІ: 110-112

Сорт чутливий до діючої речовини метрибузин



Універсальний сорт для всіх кліматичних зон



Характеризується гарною посухостійкістю



Навіть за надмірного зволоження має надзвичайну стійкість до вилягання, основних хвороб та дуже рівномірно достигає



Рекордсмен за урожайністю: 1-ше місце у випробуваннях країн ЄС в сегменті 00 сортів

Ступінь гілкування	Ширина міжряддя	Густота на час збирання
від низького до середнього	12,5 – 25 см	500-600 тис/га
Тип росту	Колір квітки	Насінневий рубчик
напівдетермінантний	фіолетовий	світлий
Маса тисячі зерен	Вміст протеїну	Олійність
170-190 г	40-42%	20-22%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 9
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БАКТЕРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПЕРОНОСПОРОЗ	● ● ● ● ● 6 ● ● ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

АНГЕЛІКА

СЕРЕДНЬОРАННЯ [00]

СНУ 2675

ДНІ: 112-115



Має надзвичайну здатність до гілкування та, навіть на зріжджених посівах, максимально реалізує свій потенціал урожайності



Сорту притаманні: помірний стартовий розвиток на початкових етапах, висока маса тисячі насінин



Має виражену посухостійкість і добру адаптивність до стресів різного характеру

Ступінь гілкування	Ширина міжряддя	Густота на час збирання
високий	25-70 см	350-450 тис/га
Тип росту	Колір квітки	Насінневий рубчик
індетермінантний	фіолетовий	світлий
Маса тисячі зерен	Вміст протеїну	Олійність
175-210 г	40-42%	20-22%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БАКТЕРІОЗ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ПЕРОНОСПОРОЗ	● ● ● ● ● ● 8 ● ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

TURBOSOY



Підвищення урожайності при застосуванні



Придатний для звичайного та органічного землеробства



Має високий вміст азотфіксуючих бактерій, що збільшує урожайність на 300-500 кг/га та більше в порівнянні до контролю



За рахунок своєї норми використання дозволяє підвищити якість протруєння насіння сої зменшивши норми робочого розчину

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Форма препарату	Норма витрат
Містить принаймні 2*10 ¹⁰ КОУ/г препарату	Стерильна рідка формуляція	2 Л/Т TURBOSOY +0,5 Л/Т ПРЕМАКС
Умови зберігання	Термін придатності обробленого препаратом насіння	Спектр дії
+1...+25°C (+4...+15°C)	90-120 днів	Сприяє акумуляції рослинного азоту в доступній формі

ПЕРЕВАГИ:

БАКТЕРІАЛЬНИЙ ПРОТЕКТОР

ТЕХНОЛОГІЯ ТОР

ТЕХНОЛОГІЯ БІОІНДУКЦІЇ.....

БІЛЬШ РАННЄ І ЕФЕКТИВНЕ ФОРМУВАННЯ БУЛЬБОЧОК

ЄДИНИЙ БІОІНДУКТОР НА РИНКУ

ЗБІЛЬШУЄ КОРЕНЕВУ МАСУ

ПРАЦЮЄ У СТРЕСОВИХ УМОВАХ



ЯРІ КУЛЬТУРИ:

ГОРОХ
ПШЕНИЦЯ
ЯЧМІНЬ
РІПАК
ОВЕС
ЛЮЦЕРНА
ГАРБУЗ

ГОРОХ ЛЮМП

СЕРЕДНЬОРАННІЙ ДНІ: 80-82



Придатний для раннього посіву у лютневій вікна



Висока і стабільна врожайність зерна та високий вміст білка у зерні



Завдяки швидким темпам стартового розвитку, досить продуктивно використовує вологу у засушливих регіонах



Відмінна стійкість до вилягання під час вегетації і перед збиранням

НОРМА ВИСІВУ

Достатнє зволоження	Нестійке зволоження	Недостатнє зволоження
95-105 схожих н.с./ м²	90-100 схожих н.с./ м²	80-85 схожих н.с./ м²

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма зерна	Колір зерна	Напрямок використання
кругла	жовтий	зерновий
Маса тисячі зерен	Вміст білка	
220-250 г	24-27%	

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ..... 9

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ 8

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ 8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

АСКОХІТОЗ 8

АНТРАКНОЗ..... 8

БОРОШНИСТА РОСА..... 8

КОРЕНЕВІ ГНІЛІ 9

ГОРОХ ВЕЛЬВЕТ

СЕРЕДНЬОРАННІЙ ДНІ: 82-84



Має високу стійкість до аскохитозу, стеблової та кореневої гнилей, борошнистої роси



Високоврожайний пластичний сорт



Потужний стартовий ріст



Відмінна стабільність та якість зерна



Підвищена стійкість до посушливих умов



Відмінна стійкість до осипання та розтріскування

НОРМА ВИСІВУ

Достатнє зволоження	Нестійке зволоження	Недостатнє зволоження
98-110 схожих н.с./ м²	92-102 схожих н.с./ м²	80-85 схожих н.с./ м²

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма зерна	Колір зерна	Напрямок використання
кругла	жовтий	зерновий
Маса тисячі зерен	Вміст білка	
220-240 г	24-29%	

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ..... 8

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ 7

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

АСКОХІТОЗ 8

АНТРАКНОЗ..... 8

БОРОШНИСТА РОСА..... 8

КОРЕНЕВІ ГНІЛІ 8

М'ЯКА ЯРА ПШЕНИЦЯ ГРЕННІ

СЕРЕДНЬОРАННІЙ ДНІ: 82-84



Сорт компенсаційного типу, який має потужне кущення та великий колос



Відмінні хлібопекарські якості



Дуже висока стійкість до хвороб листя в поєднанні з стабільно високою врожайністю



Висока стійкість до фузаріозу колосу

НОРМА ВИСІВУ

Достатнє зволоження	Нестійке зволоження	Недостатнє зволоження
420-480 схожих н.с./ м²	380-420 схожих н.с./ м²	340-380 схожих н.с./ м²

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Різновид	За хлібопекарною якістю	Маса тисячі зерен	Вміст білка
ЕРЕТРОСПЕРМУМ (остиста)	сильна	42-45 г	13-15%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО	
ФУЗАРІОЗ КОЛОСА	● ● ● ● ● ● ● ● 8
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 7
БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● 9
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● 8

М'ЯКА ЯРА ПШЕНИЦЯ ПАТРІЦІЯ (ДВОРУЧКА)

СЕРЕДНЬОРАННІЙ ДНІ: 82-84



Сорт з яскраво вираженою кореневою системою та дуже стійкий до вилягання та посушливих умов



Яра остиста пшениця з високою врожайністю та якісними показниками (група Е/А)



Добре адаптується до різних кліматичних та ґрунтових умов



Хороша стійкість до кислотності ґрунту



Високий рівень білка, глютену, число падіння, а також хороша стійкість до проростання в колосі



Унікальне поєднання гнучкості термінів посіву та врожайності

НОРМА ВИСІВУ

Достатнє зволоження	Нестійке зволоження	Недостатнє зволоження
420-480 схожих н.с./ м²	380-420 схожих н.с./ м²	340-380 схожих н.с./ м²

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Різновид	За хлібопекарною якістю	Маса тисячі зерен	Вміст білка	Натура зерна
ЕРЕТРОСПЕРМУМ (остиста)	цінна	42-45 г	15-18 %	770-810

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО	
ФУЗАРІОЗ КОЛОСА	● ● ● ● ● ● ● ● 8
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● 9
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● 8



Має дуже високу стійкість до умов дефіциту вологи, що робить його флагманом у зонах критичного зволоження



Сорт показує високі та стабільні значення для натур, вмісту білка, склоподібності та вмісту жовтого пігменту

НОРМА ВИСІВУ

Достатнє зволоження	Нестійке зволоження	Недостатнє зволоження
450-500 схожих н.с./ м²	400-450 схожих н.с./ м²	340-380 схожих н.с./ м²

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Різновид	Склоподібність	Маса тисячі зерен	Вміст білка
ЕРЕТРОСПЕРМУМ (остиста)	92-96%	44-48 г	12,8-15,1%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

ФУЗАРІОЗ КОЛОСА	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● 9
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● 8 ●



Висока стійкість до проростання у колосі



Сорт із стабільною урожайністю



Відмінна якість для виготовлення макаронних виробів



Гарна стійкість до основних хвороб

НОРМА ВИСІВУ

Достатнє зволоження	Нестійке зволоження	Недостатнє зволоження
450-500 схожих н.с./ м²	400-450 схожих н.с./ м²	340-380 схожих н.с./ м²

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Різновид	Склоподібність	Маса тисячі зерен	Вміст білка
ЕРЕТРОСПЕРМУМ (остиста)	90-92 %	44-50 г	13-15%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

ФУЗАРІОЗ КОЛОСА	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 7 ●
БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● 9
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

ТВЕРДА ЯРА ПШЕНИЦЯ ДУРОФІНУС

СЕРЕДНЬОРАННІЙ ДНІ: 86-88



Сорт який демонструє високі показники якості навіть у зволжених умовах



Раннє колосіння та середньораннє дозрівання, дозволяє досягти вищих показників урожайності



Сорт із чудовою стійкістю до вилягання



Має високу толерантність до бурої іржі, борошнистої роси



За рахунок високого вмісту жовтих пігментів підходить для виробництва макаронних виробів без яєць, так як тісто має більш виражений жовтий колір

НОРМА ВИСІВУ

Достатнє зволоження	Нестійке зволоження	Недостатнє зволоження
480-500 схожих н.с./ м²	420-480 схожих н.с./ м²	350-380 схожих н.с./ м²

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Різновид	Склоподібність	Маса тисячі зерен	Вміст білка
ЕРЕТРОСПЕРМУМ (остиста)	91-96%	43-47 г	13,5-15,5%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

ФУЗАРІОЗ КОЛОСА	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ ВІЛЬМА

СЕРЕДНЬОРАННІЙ ДНІ: 85-90



Крупне зерно відмінної якості



Сорт ярого ячменю зі стабільно високою врожайністю



Середньорослий сорт, стійкий до вилягання та з гарною стійкістю до основних хвороб



Сорт не вибагливий до ґрунтово-кліматичних умов вирощування

НОРМА ВИСІВУ

Достатнє зволоження	Нестійке зволоження	Недостатнє зволоження
320-360 схожих н.с./ м²	280-320 схожих н.с./ м²	250-280 схожих н.с./ м²

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Різновид	Нарямок використання	Маса тисячі зерен	Вміст білка
НУТАНС (двохрядний)	Зерновий	45-55 г	10,5-14%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ СТЕБЛА	● ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ КОЛОСУ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ІНТЕНСИВНІСТЬ КУЩЕННЯ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

КАРЛИКОВА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
РИНХОСПОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
СІТЧАТСТА ПЛЯМИСТІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●



Раннє цвітіння та дозрівання



Висока урожайність на рівні гібридів



Висока олійність



Відмінна стійкість до хвороб

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

Норма висіву	Ширина міжряддя
0,8 – 1,2 млн/га	12,5-45 см

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маса тисячі зерен	Вміст білка	Вміст олії
3,8-5,5 г	22-24%	44-48%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ ● ● ● ● ● ● ● ● 9

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ ● ● ● ● ● ● ● 8 ●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

ФОМОЗ ● ● ● ● ● ● ● 8 ●



Має дуже швидке відростання після укусу



Посухостійкий сорт



Слугує високоякісною кормовою базою для сінажу



Середньораннє цвітіння



Добре відгукується на вапнування ґрунту задля формування симбіотичного потенціалу рослин

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

Рекомендована норма висіву		Рекомендована норма висіву з підсівом	
20-25 кг/га (8-10 млн/га)		15 кг/га (6-7,5 млн/га)	
Час посіву	Глибина посіву	Ширина міжрядь	
лютий-середина серпня	1,5-2,5 см	7,5-19 см	
Маса тисячі зерен	Вміст протеїну	Відростання після скошування	Упаковка
2-2,5 г	21-25%	20-25 днів	25 кг

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ ● ● ● ● ● ● 7 ● ●

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ ПІСЛЯ УКУСУ ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БОРОШНИСТА РОСА ● ● ● ● ● ● ● 8 ●

ІРЖА ЛЮЦЕРНИ ● ● ● ● ● ● 7 ● ●

АСКОХІТОЗ ● ● ● ● ● ● ● 8 ●

БУРА ПЛЯМИСТІСТЬ ● ● ● ● ● ● ● 8 ●

ОВЕС ПЛАТІН

СЕРЕДНЬОРАННІЙ ДНІ: 88-92



Завдяки своїй пластичності, демонструє максимально високі врожаї у різних зонах зволоження



Стабільний, збалансований сорт із середньою висотою рослин



Поєднання ранньої стиглості та високої врожайності



Сорту притаманний високий ступінь кущення за рахунок швидких початкових темпів розвитку



Характерною особливістю є висока маса тисячі насінин

НОРМА ВИСІВУ

Достатнє зволоження	Нестійке зволоження	Недостатнє зволоження
320-350 схожих н.с./ м²	280-320 схожих н.с./ м²	250-280 схожих н.с./ м²

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір насін- невих лусок	Різновид	Натура зерна	Маса тисячі зерен	Вміст білка
жовтий	плівчастий	490-515 г/л	42-48 г	13,5-16,5%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВІЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
РИНХОСПОРИОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СІТЧАТСТА ПЛЯМИСТІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●

ОЛІЙНИЙ ГАРБУЗ ПАБЛО

NEW

РАННЬОСТИГЛИЙ ДНІ: 100-105



Це плетучий гібрид, що вражає дуже високими врожаєм та чудовою толерантністю до хвороб



Новий гібрид голонасінного олійного гарбуза для раннього збору врожаю або пізнього посіву



Дуже швидкий розвиток сприяє ранньому закриттю посівів і ефективно протидіє небажаному росту бур'янів



Завдяки мінімальній кількості гнилих і дрібних плодів, демонструє надзвичайно однорідний і рівномірний урожай



Врожайність сухого насіння (1,1 – 1,4 т/га)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

Норма висіву	Глибина посіву	Ширина міжрядь
18 тис. насінин /га	4-5 см	70-140 см

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості	Різновид	Маса тисячі зерен	Вміст олії
ранньостигла	голонасінний	175-195 г	46-49%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

ВІРУСІВ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ГАРБУЗОВА МОЗАІКА	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ПЕРОНОСПОРОЗ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ГНИЛЬ ПЛОДІВ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●

ОЛІЙНИЙ ГАРБУЗ БЕППО

РАНЬОСТИГЛИЙ ДНІ: 115



Достигає на 15 - 20 днів раніше, ніж всі еталонні сорти



Ранньостиглий гібрид олійного голонасінного гарбуза



Висока врожайність зерна (0,8 – 1,2 т/га)



Гарна стійкість до хвороб та посухи



Висока маса 1000 насінин



Високий вміст олії в зерні

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

Норма висіву	Глибина посіву	Ширина міжрядь
18-20 тис. насінин /га	4-5 см	70-140 см

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості	Різновид	Маса тисячі зерен	Вміст олії
ранньостигла	голонасінний	130-160 г	38-45%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ..... ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

ГАРБУЗОВА МОЗАЙКА ● ● ● ● ● ● ● 8 ●

БОРОШНИСТА РОСА ● ● ● ● ● ● ● 8 ●

ГНИЛЬ ПЛОДІВ ● ● ● ● ● ● ● 8 ●

ОЛІЙНИЙ ГАРБУЗ ЕНЦО

СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ ДНІ: 125-130



Дуже швидкі початкові темпи росту



Середньостиглий гібрид олійного голонасінного гарбуза



Дуже хороша стійкість до листових хвороб



Добра стійкість до плодової гнилі



Врожайність сухого насіння (1,2 – 1,8 т/га)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ:

Норма висіву	Глибина посіву	Ширина міжрядь
17-18 тис. насінин /га	4-5 см	70-140 см

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості	Різновид	Маса тисячі зерен	Вміст олії
середньостигла	голонасінний	200-220 г	47-50%

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ..... ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ ● ● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО

ВІРУСІВ ● ● ● ● ● ● ● 8 ●

ГАРБУЗОВА МОЗАЙКА ● ● ● ● ● ● 7 ● ●

ПЕРОНОСПОРОЗ..... ● ● ● ● ● ● 7 ● ●

ГНИЛЬ ПЛОДІВ ● ● ● ● ● ● ● ● 9

СУМІШІ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР



Для покращення структури ґрунту та для його захисту

Saatbau Linz займається вже багато років темою «проміжних культур» в Австрії та успішно використовує цей досвід на території України та інших країнах ЄС.

Проміжні культури роблять істотний внесок для покращення структури ґрунту та для його захисту від деградації ґрунтів. Також вони сприяють покращенню гумусового балансу ґрунтів. Проміжні культури не лише позитивно впливають на ґрунт та його родючість завдяки постійному ґрунтовому покриву. Вирощування проміжних культур безпосередньо має позитивний вплив на вирощування рослини.

Щоб завжди рухатися вперед у цій галузі, нами було розроблено безліч різноманітних сумішей, які на практиці набули широкого визнання. Усі суміші Saatbau Linz ґрунтуються на австрійській програмі природозберігаючого сільського господарства.

У такий спосіб ми можемо запропонувати нашим клієнтам широкий вибір перевірених сумішей, поряд із сертифікованими індивідуальними компонентами.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЗБІЛЬШЕННЯ ОРГАНІКИ ТА БІОМАСИ В ҐРУНТІ
- НАКОПИЧЕННЯ ТА ПРИСКОРЕННЯ УТВОРЕННЯ ГУМУСУ
- ПОЛІПШЕННЯ ПРОНИКНЕННЯ В ҐРУНТОВІ ЧАСТИНКИ ВОДИ І ПОВІТРЯ
- ПОКРАЩЕННЯ СТРУКТУРИ ҐРУНТУ
- ЗМЕНШЕННЯ ҐРУНТОВОЇ ТА ВІТРОВОЇ ЕРОЗІЇ
- РЕГУЛЯЦІЯ КИСЛОТНОСТІ ҐРУНТУ
- ОТРИМАННЯ КОРИСНИХ КОМПОНЕНТІВ З ГЛИБОКИХ ШАРІВ ҐРУНТУ
- АКТИВУЮТЬ РІСТ КОРИСНИХ ҐРУНТОВИХ МІКРООРГАНІЗМІВ
- СПРИЯЮТЬ ПРИГНІЧЕННЮ БУР'ЯНІВ
- БЛОКУВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕЯКИХ ХВОРОБ
- РОБЛЯТЬ СІВОЗМІНУ БІЛЬШ ГНУЧКОЮ



ТРАВСУМІШІ

BODENFIT®

КОМПОНЕНТИ СУМІШІ:

сафлор, олійний льон, меліоративна редька, олександрійська конюшина, суданська трава, мунго, яра вика.

Фасування	Терміни посіву	Оптимальні норми висіву
15 кг	червень – серпень	30 кг/га

Співвідношення суміші **BODENFIT®** гарантує легко розщеплюваний вуглець для мікробіоти. Має багаторівневу кореневу систему, яка включає як поверхневе коріння (мунго), так і рослини із потужним стрижневим коренем (сафлор, меліоративна редька).

Така коренева система забезпечує не тільки покращення структури ґрунту, але і суттєво сприяє накопиченню гумусу.

WASSERGÜTE FRÜH

КОМПОНЕНТИ СУМІШІ:

олександрійська конюшина, конюшина звичайна, фацелія Міра, мунго.

Фасування	Терміни посіву	Оптимальні норми висіву
12 кг	до початку серпня	12 кг/га

Суміш **WASSERGÜTE FRÜH** не містить хрестоцвітних культур та підходить для всіх сізовмін. Компоненти, які містить ця суміш, не схильні до утворення жилистих рослин, що робить суміш оптимальною як попередника для всіх ярих культур.

Окрім того, суміш **WASSERGÜTE FRÜH** добре заощаджує вологу та має високу посухостійкість, тож Mungo та фацелія дуже добре ростуть за посушливих умов.

Суміш **WASSERGÜTE FRÜH** потрібно висівати у дрібно структуроване посівне ложе.

NITROFIT

АЗОТНА БОМБА ДЛЯ ҐРУНТУ

КОМПОНЕНТИ СУМІШІ:

яра вика, горошок посівний, конюшина олександрійська, сафлор, кормовий горох (пелюшка), меліоративна редька, трава суданська, мунго.

Фасування	Терміни посіву	Оптимальні норми висіву
20 кг	червень - початок серпня	60 кг/га

Основу успіху **NITROFIT** становить горох (кормовий горох (пелюшка) та посівний горошок), який вражає своїми чудовими властивостями: високою здатністю зв'язувати азот та відмінним розпушуванням ґрунту.

Як партнери змішування в **NITROFIT**, вони демонструють всю свою силу в поєднанні з 6 іншими культурами з 4 різних сімейств рослин.

На додаток до азотфіксації, такі культури як: горох, яра вика і олександрійська конюшина, меліоративна редька і сафлор - руйнують ущільнені шари ґрунту своїм потужним стрижневим корінням і зберігають поживні речовини.

Mungo та суданська трава дуже добре ростуть у посушливих умовах і доповнюють цю суміш.

Важливим критерієм вибору партнерів для змішування було, серед іншого, чудове вимірювання, перевірене протягом кількох років випробувань.

Завдяки біорізноманіттю **NITROFIT** створює дуже добрий ґрунтовий покрив, що є гарантією низького тиску бур'янів навесні.

WASSERGÜTE FEIN

ДЛЯ РАНЬОГО КОМБІНОВАНОГО ВИРОЩУВАННЯ

КОМПОНЕНТИ СУМІШІ:

фацелія міра, олександрійська конюшина, конюшина звичайна, стійка до нематод олійна редька.

Фасування	Терміни посіву	Оптимальні норми висіву
15 кг	від середини липня до середини серпня	15 кг/га

Суміш **WASSERGÜTE FEIN** містить компоненти для вологих, а також для посушливих умов. Олександрійська конюшина і олійна редька краще ростуть у вологих умовах, а фацелія добре переносить посуху.

Крім того, конюшина олександрійська та конюшина звичайна добре фіксують азот, а олійна редька має протинематодну дію.

Завдяки біорізноманіттю суміші **WASSERGÜTE FEIN** створює дуже добрий ґрунтовий покрив, що є гарантією низького тиску бур'янів.

При вирощуванні цієї суміші слід ретельно підготувати посівне ложе та обов'язково закоткувати.

FUTTERPROFI EI

БАГАТОРІЧНА КОНЮШИННО-ЗЛАКОВА СУМІШ

КОМПОНЕНТИ СУМІШІ:

інкарнатна конюшина, однорічний райграс, багаторічний райграс, італійський райграс, олександрійська конюшина.

Фасування	Терміни посіву	Оптимальні норми висіву
10 кг	квітень-серпень	30-40 кг/га

FUTTERPROFI EI — це багаторічна конюшинно-злакова суміш, забезпечує швидкі максимальні врожаї та ідеальний корм.

У разі будь-якого дефіциту основних кормів, який може бути викликаний погодою або шкідниками, ця суміш створює ідеальний баланс.

Комбінація цієї суміші особливо підходить для прямого посіву після озимих зернових з подальшим посівом кукурудзи на силос.

Максимальний потенціал урожайності досягається з першого укосу.

При вирощуванні кукурудзи на силос, **FUTTERPROFI EI** також можна використовувати як додатковий корм і значно збільшити кількість та якість корму.

BIENENTRACHTBRACHE

КОМПОНЕНТИ СУМІШІ:

малинова конюшина, перська конюшина, фацелія, коріандр, календула, тмин, рижій, мальва, агростемма, бурачник, васильки справжні, мак, соняшник і гречка.

Фасування	Терміни посіву	Оптимальні норми висіву
10 кг	початок квітня — середина червня	20-25 кг/га за оптимальних умов посіву

Однорічна рясноквітуча суміш **BIENENTRACHTBRACHE** забезпечує протягом тривалого періоду пилком і нектаром бджіл та інших комах-запилювачів, так, що ациклічно долається харчовий розрив між цвітінням сільськогосподарських культур.

Рекомендується для пасічників, цвіте з липня по вересень.

ШУКАЙТЕ НАС
В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ





ТОВ «ЗАТБАУ ПРОБСТДОРФЕР УКРАЇНА»
02132 Київ, вул. Дніпровська набережна, 26 Ж, оф. 29-32
Tel: +38 044 227 85 80
<https://www.sb-ps-ua.com>
<https://www.facebook.com/saatbau.probstdorfer.ukraine>