

КАТАЛОГ ОЗИМИХ КУЛЬТУР



SAATBAU
Saat gut, Ernte gut.



PROBSTDORFER
SAATZUCHT

SAATBAU PROBSTDORFER UKRAINE: ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ У СЕЛЕКЦІЇ ТА ВИРОБНИЦТВІ НАСІННЯ

Ласкаво просимо у майбутнє сільського господарства – Ваш продуктивний каталог! Сільське господарство змінюється – і разом з ним змінюються вимоги до високопродуктивного, стійкого та надійного насіння. Ми – не просто насіннева компанія, а рушійна сила сучасного, перспективного сільського господарства.

Наші корені – в практиці: від аграріїв і для аграріїв. Наші знання походять безпосередньо з полів, наші сорти перевірені та вдосконалені досвідченими практиками. Ми пропонуємо не просто насіння – ми пропонуємо рішення для підвищення врожайності, стійкості культур і довготривалого збереження родючості ґрунтів.

Чому саме наше насіння?

- Сорти, перевірені на практиці – Розроблені та протестовані для специфічних умов вашого регіону
- Інновації зустрічаються з досвідом – Вирощено за допомогою найсучасніших технологій, перевірено справжніми аграріями
- Консультації з доданою вартістю – Не просто продаж – ми супроводжуємо вас експертними знаннями та практичним досвідом

SAATBAU PROBSTDORFER UKRAINE є частиною потужного партнерства:

- **SAATBAU LINZ eGen** – Одна з найбільших сільськогосподарських кооперативів Австрії, що об'єднує понад 3 200 фермерів
- **PROBSTDORFER SAATZUCHT** – Провідне приватне селекційне підприємство з сильним фокусом на Центральну та Східну Європу



Це партнерство об'єднує інноваційну потужність сучасного селекційного підприємства з багаторічним сільськогосподарським досвідом – що означає сорти, ідеально адаптовані до ваших потреб.

Наш асортимент – більше, ніж просто насіння!

Ми пропонуємо широкий вибір культур для вашого сівозмінного циклу:



Кукурудза – Висока врожайність і швидка віддача вологи



Соняшник – Високий вміст олії та продуктивність



Соя – Економічно вигідне джерело білка



Зернові – Пшениця, тверда пшениця, ячмінь – адаптовані до регіональних умов



Сидеральні культури – Покращення ґрунту та стійкі сівозмінні системи

Ваша перевага – більше, ніж просто продукт

- Ми пропонуємо не тільки насіння – ми надаємо знання. Наша команда консультантів має доступ до багаторічного практичного досвіду Австрії та України, щоб надати вам найкращу підтримку.
- Кожен сорт – це інвестиція у ваше майбутнє. Наша селекція базується на десятиліттях наукових досліджень і перевірених практик.
- Ставайте частиною сильної спільноти. Наш досвід та відданість спрямовані на довгостроковий успіх.
- Готові до нової ери сільського господарства?

Ознайомтеся з нашим асортиментом – розробленим аграріями для аграріїв!



ЗМІСТ

AGROSOL – СТИМУЛЯТОР РОСЛИН	6
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ	
АГРОСОЛ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ	8
СУМІШІ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР	10
ЩО ТАКЕ СИДЕРАЛЬНІ СУМІШІ?	12
НАЙВАЖЛИВІШІ ФУНКЦІЇ СУМІШЕЙ	
СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР	13
СУМІШІ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР	14
FUTTERPROFI EI	15
BIENENTRACHTBRACHE	15
BODENFIT®.....	16
NITROFIT.....	16
WASSERGÜTE FRÜH	17
WASSERGÜTE FEIN	17
ЛА РОККА люцерна	18
СОРТИ ТА ГІБРИДИ ОЗИМОГО РІПАКУ	20
АСОРТИМЕНТ ОЗИМОГО РІПАКУ 2025	22
КЛАРУС гібрид озимого ріпаку.....	23
ГРАФ гібрид озимого ріпаку.....	24
АСТАНА гібрид озимого ріпаку.....	25
ПІРОЛ гібрид озимого ріпаку	26
КЕНТАКІ гібрид озимого ріпаку	27
ВОЛЛІ високоолеїновий сорт озимого ріпаку.....	28
ШЕРВУД сорт озимого ріпаку	29
СОРТИ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР	30
АСОРТИМЕНТ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ 2025	32

РОЗРАХУНОК НОРМИ ВИСІВУ ДЛЯ	
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР	34
АПЕКСУС пшениця м'яка озима	36
АКТИВУС пшениця м'яка озима	37
МАУРІЦІО пшениця м'яка озима	38
БАЛАТОН пшениця м'яка озима	39
САРАТУС пшениця м'яка озима	40
АУРЕЛІУС пшениця м'яка озима.....	41
ЦАМПАНО пшениця м'яка озима	42
ТУРАНУС пшениця м'яка озима	42
САЛАМУС пшениця м'яка озима	44
ТОННАЖ пшениця м'яка озима.....	45
ВОЛЬТАЖ пшениця м'яка озима	46
ПАТРІЦІЯ (дворучка) пшениця м'яка озима.....	47
ТЕННОДУР пшениця тверда озима	48
ДІАДУР пшениця тверда озима	49
АМІДУР пшениця тверда озима.....	50
АТТЕРГАУЕР ДІНКЕЛЬ спельта озима	51
ПАРАЦЕЛЬСУС спельта озима	52
ТРИБОНУС тритикале озимий	53
АСОРТИМЕНТ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ 2025	54
АДАЛІНА ячмінь озимий	55
ХАННЕЛОРЕ ячмінь озимий	56
ФІНОЛА ячмінь озимий	57
МАРІССА ячмінь озимий	58
АРКАНДА ячмінь озимий.....	59
СУЕЦ ячмінь озимий пивоварний.....	60



AGROSOL – СТИМУЛЯТОР РОСЛИН – єдине на ринку позакореневе добриво, яке, як доведено, стимулює дихання CO₂ у рослин. Рослинам потрібен вуглекислий газ CO₂ для фотосинтезу та вироблення кисню в процесі.

Завдяки запатентованій технології AGROSOL дозволяє підвищити міжклітинну концентрацію CO₂ і тим самим стимулювати рослину до досягнення більш високих показників фотосинтезу та асиміляції.

- Підвищує продуктивність фотосинтезу до 18%;
- Підвищує рівень хлорофілу до 125%;
- Ауксини сприяють процесам подовження клітин;
- Цитокініни стимулюють ріст коренів та поділ клітин;
- Гіберелін підтримує процеси росту та диференціації клітин;
- Амінокислоти покращують засвоєння азоту;
- Покращує обмінні процеси, підвищує стійкість до біотичних і абіотичних стресів, збільшує приріст біомаси за рахунок стимуляції CO₂;
- Ca і Mg підтримують стабілізацію тканин. Ці елементи є важливими для різних метаболічних, гормональних і ферментативних процесів;
- S підвищує ефективність використання азоту;
- Покращує кормову цінність кукурудзяного силосу та зеленої маси кормових трав



ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

Склад: 25,2% - CaO; 1,5% - MgO; 1,2% - S

Амінокислоти, вторинні рослинні речовини, макро- та мікроелементи, фітогормони ауксин, цитокінін і гіберелін із екстракту бурих водоростей.

AGROSOL можна застосовувати разом з багатьма агрохімікатами, дозволяючи легко інтегрувати продукт в програми захисту рослин і позбавитися необхідності у проведенні окремих обприскувань. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

Показник pH: 8,3

Щільність: 1,4

Упаковка: 10 л, вага 14,5 кг.

Термін придатності: 18 місяців з дати виробництва.



РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АГРОСОЛ
У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

Культура	Локація	Норма внесення	Фаза культури	Урожайність без обробки ц/га	Урожайність з Agrosol ц/га	Прибавка ц/га (2024)
Кукурудза	Київська обл., Переяслав Хмельницький р-н, с. Хоцьки	4	8-9 листів	80	83,4	3,4
Соя	Київська обл., Переяслав Хмельницький р-н, с. Хоцьки	2+2	ВВСН 22, наступна обробка через 14 днів	25	27,8	2,8
Соняшник	Київська обл., Бориспільський р-н, с. Головурів	3	4 пари листків	25,2	27	1,8
Соя	Київська обл., Бориспільський р-н, с. Головурів	2+2	ВВСН 18, ВВСН 30	30,5	33	2,5

ВИКОРИСТАННЯ НА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУРАХ
ОЗИМІ ЗЕРНОВІ

Осінньо-весняне внесення		
Внесення №1 (Осінь)	2 л/га	фаза ВВСН 13 - 23 або зі стадії 3-х листків до закінчення вегетаційного періоду*
Внесення №2 (Весна)	2 л/га	3 початку вегетаційного періоду
Тільки весняне внесення		
Внесення №1	2 л/га	3 початку вегетаційного періоду до фази ВВСН 30/31
Внесення №2	2 л/га	Через 14 днів після першого внесення

Зверніть увагу, що перерва між внесеннями повинна бути приблизно 10 днів.

РІПАК ОЗИМИЙ

Осінньо-весняне внесення		
Внесення №1 (Осінь)	2 л/га	Починаючи з фази ВВСН 13 до закінчення вегетаційного періоду*
Внесення №2 (Весна)	2 л/га	3 початку вегетаційного періоду
Внесення №3 (Весна)	2 л/га	Через 14 днів після другого внесення
Тільки весняне внесення		
Внесення №1	3 л/га	3 початку вегетаційного періоду до фази ВВСН 32
Внесення №2	3 л/га	Через 14 днів після першого внесення

Зверніть увагу, що перерва між внесеннями повинна бути приблизно 10 днів.

БУРЯК

Внесення №1	2 л/га	4-6 листків
Внесення №2	2 л/га	Через 14 днів після першого внесення
Внесення №3	2 л/га	Через 14 днів після другого внесення
Внесення №4	3 л/га	Через 14 днів після третього внесення

КУКУРУДЗА

Внесення №1	3-4 л/га	Починаючи з фази ВВСН 13 (початковий розвиток)
-------------	----------	--

СОНЯШНИК

Внесення №1	2 л/га	Фаза ВВСН 13-21 або висота рослини 5-16 см
Внесення №2	2 л/га	Через 14 днів після першого внесення
Внесення №3	2 л/га	Якщо дозволяють умови вегетації

СОЯ

Внесення №1	2 л/га	Фаза ВВСН 13-29 або за висоти рослин 5-20 см
Внесення №2	2 л/га	Через 14 днів після першого внесення
Внесення №3	2 л/га	Якщо дозволяють умови вегетації

ВИКОРИСТАННЯ У САДАХ ТА ВИНОГРАДНИКАХ

ЯБЛУНІ / ГРУШІ

Внесення №1	2,5 л/га	Фаза ВВСН 19 - 25
Внесення №2	2,5 л/га	Через 14 днів після першого внесення
Внесення № 3-6	2,5 л/га	Кожне внесення з інтервалом в 14 днів

ВИНОГРАДНИКИ

Внесення №1	2,5 л/га	Бутонізація
Внесення №2	2,5 л/га	Початок цвітіння
Внесення №3	2,5 л/га	Через 14 днів після другого внесення
Внесення №4	2,5 л/га	Через 14 днів після третього внесення

ВАЖЛИВО! Загальний об'єм внесення не повинен бути нижчим за 10 л

ВИКОРИСТАННЯ НА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУРАХ

КАРТОПЛЯ

Насіннєва та харчова		
Внесення №1	2 л/га	Фаза ВВСН 20 або за довжини рослин 10-15 см
Внесення №2	2 л/га	Через 14 днів після першого внесення
Внесення №3	2 л/га	Через 14 днів після другого внесення
Внесення №4	3 л/га	Через 14 днів після третього внесення
Промислова та на крохмаль		
Внесення №1	2 л/га	Після змикання рядків
Внесення №2	2 л/га	Через 14 днів після першого внесення
Внесення №3	2 л/га	Через 14 днів після другого внесення
Внесення №4	3 л/га	Через 14 днів після третього внесення

Взагалі слід відмітити, що раннє внесення (з висоти культури 10-15 см) сприяє розвитку бульб.



СУМІШІ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР

ЩО ТАКЕ СИДЕРАЛЬНІ СУМІШІ?	12
НАЙВАЖЛИВІШІ ФУНКЦІЇ СУМІШЕЙ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР	13
СУМІШІ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР	14
FUTTERPROFI EI	15
BIENENTRACHTBRACHE	15
BODENFIT®	16
NITROFIT	16
WASSERGÜTE FRÜH	17
WASSERGÜTE FEIN	17
ЛА РОККА люцерна	18



ЩО ТАКЕ СИДЕРАЛЬНІ СУМІШІ?

НАЙВАЖЛИВІШІ ФУНКЦІЇ СУМІШЕЙ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР



Сидеральні культури - це культури, що вирощуються між збиранням попередньої культури та посівом наступної в ланці сівозміни.



Суміш сидеральних культур - це спеціально розроблена композиція сидеральних культур, створена з певною метою або під певну культуру.



Суміші сидеральних культур більш стійкі до несприятливих умов висів однієї сидеральної культури та є багатофункціональними за своєю дією.



Сидеральні культури можливо застосовувати за різних технологій землеробства, а також при органічному вирощуванні.



придушення росту бур'янів та зменшення гербіцидного навантаження на ґрунт



вивільнення недоступних поживних речовин



збільшення органіки і біомаси в ґрунті



захист ґрунту від вітрової та ґрунтової ерозії



накопичення та прискорення утворення гумусу



оздоровлення ґрунту (нематоди, кореневі гнилі)



розпуцільнення ґрунту (біоплуг)



накопичення азоту в ґрунті



СУМІШІ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР



Для покращення структури ґрунту та для його захисту

Saatbau Linz займається вже багато років темою «проміжних культур» в Австрії та успішно використовує цей досвід на території України та інших країнах ЄС.

Проміжні культури роблять істотний внесок для покращення структури ґрунту та для його захисту від деградації ґрунтів. Також вони сприяють покращенню гумусового балансу ґрунтів. Проміжні культури не лише позитивно впливають на ґрунт та його родючість завдяки постійному ґрунтовому покриву. Вирощування проміжних культур безпосередньо має позитивний вплив на вирощування рослини.

Щоб завжди рухатися вперед у цій галузі, нами було розроблено безліч різноманітних сумішей, які на практиці набули широкого визнання. Усі суміші Saatbau Linz ґрунтуються на австрійській програмі природозберігаючого сільського господарства.

У такий спосіб ми можемо запропонувати нашим клієнтам широкий вибір перевірених сумішей, поряд із сертифікованими індивідуальними компонентами.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЗБІЛЬШЕННЯ ОРГАНІКИ ТА БІОМАСИ В ҐРУНТІ
- НАКОПИЧЕННЯ ТА ПРИСКОРЕННЯ УТВОРЕННЯ ГУМУСУ
- ПОЛІПШЕННЯ ПРОНИКНЕННЯ В ҐРУНТОВІ ЧАСТИНКИ ВОДИ І ПОВІТРЯ
- ПОКРАЩЕННЯ СТРУКТУРИ ҐРУНТУ
- ЗМЕНШЕННЯ ҐРУНТОВОЇ ТА ВІТРОВОЇ ЕРОЗІЇ
- РЕГУЛЯЦІЯ КИСЛОТНОСТІ ҐРУНТУ
- ОТРИМАННЯ КОРИСНИХ КОМПОНЕНТІВ З ГЛИБОКИХ ШАРІВ ҐРУНТУ
- АКТИВУЮТЬ РІСТ КОРИСНИХ ҐРУНТОВИХ МІКРООРГАНІЗМІВ
- СПРИЯЮТЬ ПРИГНІЧЕННЮ БУР'ЯНІВ
- БЛОКУВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕЯКИХ ХВОРОБ
- РОБЛЯТЬ СІВОЗМІНУ БІЛЬШ ГНУЧКОЮ

FUTTERPROFI EI

БАГАТОРІЧНА КОНЮШИННО-ЗЛАКОВА СУМІШ

КОМПОНЕНТИ СУМІШІ:

інкарнатна конюшина, однорічний райграс, багаторічний райграс, італійський райграс, олександрійська конюшина.

Фасування	Терміни посіву	Оптимальні норми висіву
10 кг	квітень-серпень	30-40 кг/га

FUTTERPROFI EI — це багаторічна конюшинно-злакова суміш, забезпечує швидкі максимальні врожаї та ідеальний корм.

У разі будь-якого дефіциту основних кормів, який може бути викликаний погодою або шкідниками, ця суміш створює ідеальний баланс.

Комбінація цієї суміші особливо підходить для прямого посіву після озимих зернових з подальшим посівом кукурудзи на силос.

Максимальний потенціал урожайності досягається з першого укосу.

При вирощуванні кукурудзи на силос, **FUTTERPROFI EI** також можна використовувати як додатковий корм і значно збільшити кількість та якість корму.

BIENENTRACHT-BRASCHE

КОМПОНЕНТИ СУМІШІ:

малинова конюшина, перська конюшина, фацелія, коріандр, календула, тмин, рижий, мальва, агростемма, бурачник, васильки справжні, мак, соняшник і гречка.

Фасування	Терміни посіву	Оптимальні норми висіву
10 кг	початок квітня — середина червня	20-25 кг/га за оптимальних умов посіву

Однорічна рясноквітуча суміш **BIENENTRACHTBRASCHE** забезпечує протягом тривалого періоду пилюком і нектаром бджіл та інших комах-запилювачів, так, що ациклічно долається харчовий розрив між цвітінням сільськогосподарських культур.

Рекомендується для пасічників, цвіте з липня по вересень.

BODENFIT®

КОМПОНЕНТИ СУМІШІ:

сафлор, олійний льон, меліоративна редька, олександрійська конюшина, суданська трава, мунго, яра вика.

Фасування	Терміни посіву	Оптимальні норми висіву
15 кг	червень – серпень	30 кг/га

Співвідношення суміші **BODENFIT®** гарантує легко розщеплюваний вуглець для мікробіоти. Має багаторівневу кореневу систему, яка включає як поверхневе коріння (мунго), так і рослини із потужним стрижневим коренем (сафлор, меліоративна редька).

Така коренева система забезпечує не тільки покращення структури ґрунту, але і суттєво сприяє накопиченню гумусу.

WASSERGÜTE FRÜH

КОМПОНЕНТИ СУМІШІ:

олександрійська конюшина, конюшина звичайна, фацелія Міра, мунго.

Фасування	Терміни посіву	Оптимальні норми висіву
12 кг	до початку серпня	12 кг/га

Суміш **WASSERGÜTE FRÜH** не містить хрестоцвітих культур та підходить для всіх сізовмін. Компоненти, які містить ця суміш, не схильні до утворення жилистих рослин, що робить суміш оптимальною як попередника для всіх ярих культур.

Окрім того, суміш **WASSERGÜTE FRÜH** добре заощаджує вологу та має високу посухостійкість, тож Мунго та фацелія дуже добре ростуть за посушливих умов.

Суміш **WASSERGÜTE FRÜH** потрібно висівати у дрібно структуроване посівне ложе.

NITROFIT

АЗОТНА БОМБА ДЛЯ ҐРУНТУ

КОМПОНЕНТИ СУМІШІ:

яра вика, горошок посівний, конюшина олександрійська, сафлор, кормовий горох (пелюшка), меліоративна редька, трава суданська, мунго.

Фасування	Терміни посіву	Оптимальні норми висіву
20 кг	червень - початок серпня	60 кг/га

Основу успіху **NITROFIT** становить горох (кормовий горох (пелюшка) та посівний горошок), який вражає своїми чудовими властивостями: високою здатністю зв'язувати азот та відмінним розпушуванням ґрунту.

Як партнери змішування в **NITROFIT**, вони демонструють всю свою силу в поєднанні з 6 іншими культурами з 4 різних сімейств рослин.

На додаток до азотфіксації, такі культури як: горох, яра вика і олександрійська конюшина, меліоративна редька і сафлор - руйнують ущільнені шари ґрунту своїм потужним стрижневим корінням і зберігають поживні речовини.

Мунго та суданська трава дуже добре ростуть у посушливих умовах і доповнюють цю суміш.

Важливим критерієм вибору партнерів для змішування було, серед іншого, чудове вимірювання, перевірене протягом кількох років випробувань.

Завдяки біорізноманіттю **NITROFIT** створює дуже добрий ґрунтовий покрив, що є гарантією низького тиску бур'янів навесні.

WASSERGÜTE FEIN

ДЛЯ РАНЬОГО КОМБІНОВАНОГО ВИРОЩУВАННЯ

КОМПОНЕНТИ СУМІШІ:

фацелія міра, олександрійська конюшина, конюшина звичайна, стійка до нематод олійна редька.

Фасування	Терміни посіву	Оптимальні норми висіву
15 кг	від середини липня до середини серпня	15 кг/га

Суміш **WASSERGÜTE FEIN** містить компоненти для вологих, а також для посушливих умов. Олександрійська конюшина і олійна редька краще ростуть у вологих умовах, а фацелія добре переносить посуху.





Крім того, конюшина олександрійська та конюшина звичайна добре фіксують азот, а олійна редька має протинематодну дію.

Завдяки біорізноманіттю суміші **WASSERGÜTE FEIN** створює дуже добрий ґрунтовий покрив, що є гарантією низького тиску бур'янів.

При вирощуванні цієї суміші слід ретельно підготувати посівне ложе та обов'язково закоткувати.



Має дуже швидке відростання після укусу



МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН	2-2,5 г
ВМІСТ ПРОТЕЇНУ	21-25%
ВІДРОСТАННЯ ПІСЛЯ СКОШУВАННЯ	20-25 ДНІВ
УПАКОВКА	25 кг

Рекомендована норма висіву	Рекомендована норма висіву з підсівом
20-25 кг/га (8-10 млн./га)	15 кг/га (6,0-7,5 млн./га)

Час посіву	Глибина посіву	Ширина міжрядь
01.02-15.08	1,5-2,5 см	7,5-19 см

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ РОСТУ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
ПОЧАТКОВІ ТЕМПИ ПІСЛЯ УКОСУ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9

БОРОШНИСТА РОСА	●	●	●	●	●	●	●	8	●
ІРЖА ЛЮЦЕРНИ	●	●	●	●	●	●	7	●	●
АСКОХІТОЗ	●	●	●	●	●	●	8	●	●
БУРА ПЛЯМИСТІСТЬ	●	●	●	●	●	●	8	●	●



СОРТИ ТА ГІБРИДИ ОЗИМОГО РІПАКУ

АСОРТИМЕНТ ОЗИМОГО РІПАКУ 2025.....	22
КЛАРУС гібрид озимого ріпаку.....	23
ГРАФ гібрид озимого ріпаку.....	24
АСТАНА гібрид озимого ріпаку.....	25
ПІРОЛ гібрид озимого ріпаку	26
КЕНТАКІ гібрид озимого ріпаку	27
ВОЛЛІ високоолеїновий сорт озимого ріпаку.....	28
ШЕРВУД сорт озимого ріпаку	29



Показники	КЛАРУС	ГРАФ	АСТАНА	ПІРОЛ	КЕНТАКІ	ВОЛЛІ	ШЕРВУД
Група стиглості	ОЗИМИЙ ПІВРІД	ОЗИМИЙ ПІВРІД	ОЗИМИЙ ПІВРІД	ОЗИМИЙ ПІВРІД	ОЗИМИЙ ПІВРІД	ОЗИМИЙ СОРТ	ОЗИМИЙ СОРТ
Цвітіння	Середньоранній	Середньоранній	Середньостиглий	Середньостиглий	Середньостиглий	Середньоранній	Середньоранній
Тип:	Раннє	Дуже раннє	Середньораннє	Середньораннє	Раннє	Раннє	Раннє
Вміст	Класичний ОО	Класичний ОО	Класичний ОО	Класичний ОО	Класичний ОО	Висококлісний ОО	Класичний ОО
глюкозинолатів:	(безеруковий)	(безеруковий)	(безеруковий)	(безеруковий)	(безеруковий)	(безеруковий)	(безеруковий)
Глизування:	<14мМоль/г	<14мМоль/г	<14мМоль/г	<14мМоль/г	<14мМоль/г	<14мМоль/г	<14мМоль/г
Інтенсивне	Інтенсивне	Дуже інтенсивне	Інтенсивне	Інтенсивне	Помірне	Помірне	Інтенсивне
АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ [1-9]:							
Осіній розвиток	7	9	7	6	7	8	8
Весняний розвиток	6	8	7	7	6	8	8
Зимостійкість	8	8	8	9	8	8	9
Посуhostійкість	8	8	7	8	9	7	8
Стійкість до вилягання	9	8	9	8	8	9	8
Стійкість до розтріскування	8	9	9	9	8	9	8
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ [1-9]:							
Урожайність в засушливих умовах	8	8	7	8	8	8	7
Урожайність у зволжених умовах	8	8	9	9	8	8	8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ [1-9]:							
Фомоз	8	8	9	9	7	8	6
Склеротиніоз	7	7	7	8	6	8	7
Альтернаріоз	7	8	8	7	7	7	7
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА (ТИС.СХ.НАС/ГА) ТА ТЕРМІНИ ПОСІВУ:							
Ранні	350-400	350-400	350-400	350-400	350-400	450-500	350-450
Оптимальні	400-450	400-450	450-500	450-500	400-450	450-500	450-500
Пізні	450-500	450-500	500-550	500-550	450-500	500-550	550-600

1 ... дуже погано, дуже пізно, дуже довго, дуже вразливі 9 ... дуже добре, дуже рано, дуже короткий, дуже стійкий

Гібрид озимого ріпаку
середньоранній

КЛАРУС



Чудова зимостійкість та стійкість до вилягання



Стабільний та адаптивний до засушливих та перезволожений умов



Має дуже високу зимостійкість та стійкість до повернення ранньовесняних приморозків



Має гарне гілкування та підходить під широкорядний посів



Початкові темпи розвитку помірно швидкі, тому підходить для всіх термінів посіву



Стримане відновлення вегетації навесні



ЦВІТІННЯ РАННЄ
ТИП КЛАСИЧНИЙ ОО (безеруковий)
ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ 14 мМоль/г
ГІЛКУВАННЯ ІНТЕНСИВНЕ

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (ТИС.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
350-400	400-450	450-500

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСІННІЙ РОЗВИТОК	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ВЕСНЯНИЙ РОЗВИТОК	● ● ● ● ● ● 6 ● ●
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 9 ●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
АЛЬТЕРНАРІОЗ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●



Пластичний гібрид, який не вибагливий до технології вирощування та ґрунтів



Добре почувається на легких піщаних
грунтах



Активний осінній розвиток та швидке відновлення на весні, потужна коренева система, забезпечують придатність до пізніх термінів посіву



За раннього посіву вимагає додаткової рострегуляції



Реалізовує високий потенціал навіть за зріджених посівів

ЦВІТІННЯ	ДУЖЕ РАННЄ
ТИП.....	КЛАСИЧНИЙ 00 (безеруковий)
ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ	14 мМоль/г
ГІЛКУВАННЯ	ДУЖЕ ІНТЕНСИВНЕ

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (ТИС.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
350-400	400-450	450-500

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[illegible]

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОЗ.....	●●●●●●●●	8
СКЛЕРОТИНІОЗ.....	●●●●●●●●	7
АЛЬТЕРНАРІОЗ.....	●●●●●●●●	8

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ●	8
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ●	8



Стійкість до вірусу жовтухи турнепсу TuYV та RLM 7



Висока толерантність до фомозу та альтернаріозу



Середньораннє цвітіння та швидкий налив насіння



Відсутність ризиків вилягання, завдяки середньорослому типу рослин



Відмінна адаптивність до складних умов вирощування

ЦВІТИННЯ	СЕРЕДНЬОРАННЄ
ТИП.....	КЛАСИЧНИЙ 00 (безеруковий)
ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ	14 ммоль/г
ГІЛКУВАННЯ	ІНТЕНСИВНЕ



СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (ТИС.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
350-400	450-500	500-550

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСІННІЙ РОЗВИТОК	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ВЕСНЯНИЙ РОЗВИТОК	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 9 ●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 9 ●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОЗ	● ● ● ● ● ● ● ●	9
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ●	7
АЛЬТЕРНАРІОЗ.....	● ● ● ● ● ● ● ●	8

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ●



Завдяки генетичній стійкості до TuVY та Phoma (ген Rlm7) забезпечує максимальне розкриття потенціалу



Помірний осінній розвиток та відмінна зимостійкість гарантують безпеку врожаю



Демонструє найвищі показники урожайності, лідер за оптимальних умов



Завдяки своїм темпам розвитку, адаптивний до термінів посіву

ЦВІТІННЯ СЕРЕДНЬОРАННЕ
ТИП КЛАСИЧНИЙ 00 (безеруковий)
ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ 14 мМоль/г
ГІЛКУВАННЯ ІНТЕНСИВНЕ

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (ТИС.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
350-400	450-500	500-550

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСІННІЙ РОЗВИТОК	● ● ● ● ● 6 ● ● ●
ВЕСНЯНИЙ РОЗВИТОК	● ● ● ● ● 7 ● ● ●
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● 9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОЗ	● ● ● ● ● ● 9
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● 8 ●
АЛЬТЕРНАРІОЗ	● ● ● ● ● 7 ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● 8 ●
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● 9



Завдяки ранньому цвітінню та середньому періоду достигання забезпечує стабільний результат у різних кліматичних умовах



Потужний гібрид із високим потенціалом урожайності зерна та олії



Відмінна стійкість до посухи робить його ідеальним вибором для регіонів із обмеженим зволоженням



Має швидкі початкові темпи росту.



Здатний показати високі результати навіть на розріджених посівах

ЦВІТІННЯ РАННЄ
ТИП КЛАСИЧНИЙ 00 (безеруковий)
ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ 14 мМоль/г
ГІЛКУВАННЯ ПОМІРНЕ

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (ТИС.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
350-400	400-450	450-500

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСІННІЙ РОЗВИТОК	● ● ● ● ● 7 ● ● ●
ВЕСНЯНИЙ РОЗВИТОК	● ● ● ● ● 6 ● ● ●
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● 8 ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● 9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ	● ● ● ● ● 8 ●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОЗ	● ● ● ● ● 7 ● ● ●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● 6 ● ● ●
АЛЬТЕРНАРІОЗ	● ● ● ● ● 7 ● ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● 8 ●
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● 8 ●





Висока продуктивність за будь-яких умов



Сорт ріпаку з високим вмістом олеїнової кислоти



Низькорослий, стійкий до ламкості стебла



Найкраще поєднання гарного розвитку восени, високої зимостійкості та швидкого відновлення вегетації навесні



Господарсько-цінні ознаки на рівні і вище більшості гібридів

ЦВІТІННЯ РАННЄ
ТИП ВИСОКОЛЕЇНОВИЙ 00 (безеруковий)
ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ 14 мМоль/г
ГІЛКУВАННЯ ПОМІРНЕ

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (ТИС.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
400-450	450-500	500-550

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСІННІЙ РОЗВИТОК	● ● ● ● ● ● ● 8	●
ВЕСНЯНИЙ РОЗВИТОК	● ● ● ● ● ● ● 8	●
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8	●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● 7	●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 9	●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 9	●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8	●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8	●
АЛЬТЕРНАРІОЗ	● ● ● ● ● ● 7	●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● 7	●
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● 8	●



Сорт здатний формувати стабільно високі врожаї навіть за стресових умов вирощування



Швидке проростання і активний розвиток на початкових стадіях



Формує високу, міцну рослину з добре розвинутою листовою масою



Адаптований до вирощування в регіонах із пониженими температурами. Показує високу стійкість до прохолодної весни

ЦВІТІННЯ РАННЄ
ТИП КЛАСИЧНИЙ 00 (безеруковий)
ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ 14 мМоль/г
ГІЛКУВАННЯ ПОМІРНЕ

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (ТИС.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
350-450	450-500	550-600

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСІННІЙ РОЗВИТОК	● ● ● ● ● ● ● 8	●
ВЕСНЯНИЙ РОЗВИТОК	● ● ● ● ● ● ● 8	●
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8	●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● 7	●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 9	●
СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8	●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8	●
СКЛЕРОТИНІОЗ	● ● ● ● ● ● 7	●
АЛЬТЕРНАРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8	●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● 8	●
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● 8	●





СОРТИ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

АСОРТИМЕНТ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ 2025 32

РОЗРАХУНОК НОРМИ ВИСІВУ ДЛЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 34

АПЕКСУС пшениця м'яка озима	36
АКТИВУС пшениця м'яка озима	37
МАУРІЦІО пшениця м'яка озима	38
БАЛАТОН пшениця м'яка озима	39
САРАТУС пшениця м'яка озима	40
АУРЕЛІУС пшениця м'яка озима	41
ЦАМПАНО пшениця м'яка озима	42
ТУРАНУС пшениця м'яка озима	42
САЛАМУС пшениця м'яка озима	44
ТОННАЖ пшениця м'яка озима	45
ВОЛЬТАЖ пшениця м'яка озима	46
ПАТРИЦІЯ (дворучка) пшениця м'яка озима	47
ТЕННОДУР пшениця тверда озима	48
ДІАДУР пшениця тверда озима	49
АМІДУР пшениця тверда озима	50

АТТЕРГАУЕР ДІНКЕЛЬ спельта озима	51
ПАРАЦЕЛЬСУС спельта озима	52
ТРІБОНУС тритикале озимий	53

АСОРТИМЕНТ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ 2025 54

АДАЛІНА ячмінь озимий	55
ХАННЕЛОРЕ ячмінь озимий	56
ФІНОЛА ячмінь озимий	57
МАРІССА ячмінь озимий	58
АРКАНДА ячмінь озимий	59
СУЕЦ ячмінь озимий пивоварний	60

АСОРТИМЕНТ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ 2025

Показники	АПЕКСУС	АКТИВУС	МАУРІЦІО	БАЛАТОН	САРАТУС	АУРЕЛІУС	ЦАМПАНО	ТУРАНУС
	Озима м'яка	Озима м'яка	Озима м'яка	Озима м'яка	Озима м'яка	Озима м'яка	Озима м'яка	Озима м'яка
Група стиглості	Дуже ранній	Дуже ранній	Дуже ранній	Ранньо-стиглий	Ранньо-стиглий	Середньо-ранній	Середньо-ранній	Середньо-стиглий
Тип формування врожаю	Щільноколосовий	Щільноколосовий	Колосовий	Колосовий	Колосовий	Колосовий	Щільноколосовий	Компенсаційний
Остистість	О	О	О	БО	БО	О	О	О
Маса 1000 зерен, г	43-47	41-47	44-50	45-48	46-50	42-47	45-50	42-48
АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ [1-9]:								
Потенціал урожайності	9	8	8	8	9	9	9	9
Зимостійкість	9	8	7	8	9	8	9	9
Посухостійкість	8	9	8	7	8	8	8	8
Стійкість до вилягання	8	9	8	9	9	8	8	6
Сійкість до проростання								
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ [1-9]:								
Урожайність в засушливих умовах	9	9	8	7	7	9	9	7
Урожайність у зволжених умовах	9	7	7	8	9	8	7	7
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ [1-9]:								
Борошниста роса	8	8	8	9	8	9	8	8
Жовта іржа	8	7	8	8	7	8	6	6
Бура іржа	7	8	6	8	5	8	7	6
Септоріоз листя	7	9	7	7	7	8	8	9
Піренофороз	7	8	6	6	7	6	7	8
Фузаріоз колосу	8	7	8	8	6	8	8	8
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА (МЛН.СХ.НАС/ГА) ТА ТЕРМІНИ ПОСІВУ								
Ранні	1,5-1,8	2,5-3,2	3,0-3,5	3,2-3,8	2,8-3,2	3,0-3,5	3,0-3,5	2,5-3,2
Оптимальні	2,2-3,0	3,2-3,8	3,5-4,0	3,8-4,5	3,5-4,0	3,5-4,0	3,5-4,0	3,2-3,8
Пізні	3,5-4,0	3,8-4,5	4,0-4,5	4,5-5,2	4,5-4,8	4,0-4,5	4,0-4,5	3,8-4,5

1 ... дуже погано, дуже пізно, дуже довго, дуже вразливий 9 ... дуже добре, дуже рано, дуже короткий, дуже стійкий

АСОРТИМЕНТ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ 2025

САЛАМУС	ТОННАЖ	ВОЛЬТАЖ	ПАТРІЦІЯ	ТЕННОДУР	ДІАДУР	АМІДУР	АТТЕРГАУЕР ДІНКЕЛЬ	ПАРА-ЦЕЛЬСУС	ТРИБОНУС
Озима м'яка	Озима м'яка	Озима м'яка	Дворучка	Озима тверда	Озима тверда	Озима тверда	Озима спелта	Озима спелта	Озимий тритикале
Середньо-стиглий	Середньо-пізній	Середньо-пізній	Середньо-ранній	Ранньо-стиглий	Середньо-ранній	Середньо-стиглий	Середньо-ранній	Середньо-ранній	Середньо-стиглий
Колосовий	Компенсаційний	Компенсаційний	Компенсаційний	Колосовий	Колосовий	Колосовий	Компенсаційний		Компенсаційний
БО	БО	БО	О	О	О	О	БО	БО	О
44-48	48-52	42-48	42-45	46-50	48-56	51-58	120-125	115-135	50-58
АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ [1-9]:									
9	9	9	9	9	8	9	8	9	9
9	9	9	8	8	8	8	8	8	9
8	8	8	9	8	8	8	8	8	8
6	8	9	8	7	9	7	8	8	8
				8	7	8			
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ [1-9]:									
8	8	7	9	8	7	8	8	8	8
9	9	9	8	7	7	7	8	9	9
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ [1-9]:									
8	8	8	9	7	9	7	6	6	8
7	7	8	7	8	8	5	8	8	9
6	9	7	8	6	9	5	8	8	9
7	8	8	8	7	7	7	7	7	8
7	7	8	7	7	7	7	6	6	7
8	5	7	8	8	7	7	7	7	7
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА (МЛН.СХ.НАС/ГА) ТА ТЕРМІНИ ПОСІВУ									
2,5-3,2	2,8-3,2	2,5-3,0	3,8-4,2 (ярий посів)	3,2-3,5	3,2-3,8	3,2-3,5	1,1-1,3	1,0-1,2	2,2-2,8
3,5-3,8	3,2-3,8	3,2-3,8		3,5-4,2	3,8-4,5	3,5-4,2	1,3-1,5	1,2-1,4	2,8-3,5
4,2-4,5	3,8-4,5	4,0-4,5	4,0-4,5 (озимий посів)	4,2-4,8	4,5-5,2	4,2-4,8	1,5-1,7	1,5-1,7	3,5-4,0

1 ... дуже погано, дуже пізно, дуже довго, дуже вразливий 9 ... дуже добре, дуже рано, дуже короткий, дуже стійкий

РОЗРАХУНОК НОРМИ ВИСІВУ ДЛЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
(ПРИ СЕРЕДНІЙ СХОЖОСТІ НАСІННЯ 95%)

Бажана густота насадин/ м²	МАСА 1000 ЗЕРЕН (Г)															
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	Норма висіву (кг/га)															
250	79	85	90	95	100	105	110	116	121	126	132	137	142	147	153	158
275	87	93	99	105	110	116	122	128	133	139	145	151	157	163	169	174
300	95	102	108	114	121	126	132	139	145	151	158	164	170	177	183	189
325	103	110	117	123	130	137	143	150	157	163	170	177	184	191	197	204
350	111	119	126	133	141	148	155	162	169	176	184	191	198	205	212	219
375	119	127	135	143	151	158	166	173	181	189	196	204	212	219	227	234
400	126	135	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	248
425	134	143	153	161	170	179	188	196	205	214	223	232	240	249	258	267
450	142	152	162	171	181	190	200	209	218	228	237	246	256	265	274	284
475	150	160	171	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
500	158	169	180	190	200	211	221	232	242	253	263	274	284	295	305	316

Розрахунок кількості насіння для зернових культур:

Кількість насіння (кг/га) = $\frac{\text{бажана кількість схожих насінин/м}^2 \times \text{Масу 1000(г)}}{\text{Схожість (\%)}}$

Формула розрахунку (на прикладі озимої пшениці):

$330 \times 45 \text{ г} \div 90\% = 165 \text{ кг/га}$



Високоінтенсивний сорт із дуже раннім
достиганням, що дозволяє отримати ранній
врожай і мінімізувати погодні ризики



Має високу стійкість до морозів і надійно
зимує навіть у суворих умовах



Цей сорт демонструє стабільно високі врожаї
навіть за обмеженої кількості опадів. Ідеально
підходить для регіонів із посушливим кліматом



Має високий коефіцієнт кушення та стійкість
до вилягання



Відмінна стійкість до проростання в колосі

РІЗНОВИД ЕРЕТРОСПЕРМУМ (остистий)
ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЩІЛЬНОКОЛОСОВИЙ
ЗА ХЛІБОПЕКАРНОЮ ЯКІСТЮ В
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН 43-47 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
1,5-1,8	2,2-3,0	3,5-4,0

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● 8
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● 8
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● 7
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 7
ПІРЕНОФОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 7
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● ● ● 8

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9



Чудова толерантність до борошнистої
роси та бурі іржі



Остистий сорт для рекордів по врожайності.
Високі хлібопекарські якості



Вирізняється гарним коефіцієнтом кушення
та дуже хорошою стійкістю до вилягання



Ранній вихід в трубку та раннє дозрівання



Відмінна толерантність до посухи та
жаростійкість

РІЗНОВИД ЕРЕТРОСПЕРМУМ (остистий)
ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЩІЛЬНОКОЛОСОВИЙ
ЗА ХЛІБОПЕКАРНОЮ ЯКІСТЮ Е
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН 41-47 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
2,5-3,2	3,2-3,8	3,8-4,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● 8
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● 7
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● 8
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 9
ПІРЕНОФОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● ● ● 7

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● 7



Вдало поєднує в собі чудово виповнене зерно з високим вмістом білку, клейковини та показниками натурн



Сильний сорт з відмінною якістю зерна та високим потенціалом урожайності



Характеризується відмінною стійкістю до вилягання та жовтої іржі



Відмінні показники зимо- та посухостійкості завдяки швидкому відновленню вегетації з послідовним раннім колосінням, МАУРІЦІО максимально ефективно використовує зимові запаси ґрунтової вологн

РІЗНОВИДЕРЕТРОСПЕРМУМ (остистий)
ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮКОЛОСОВИЙ
ЗА ХЛІБОПЕКАРНОЮ ЯКІСТЮЕ
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН44-50 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
3,0-3,5	3,5-4,0	4,0-4,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● 8 ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● 8 ●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● 8 ●
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● ● 8 ●
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● 6 ● ● ●
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● 7 ● ● ●
ПІРЕНОФОРОЗ	● ● ● ● ● 6 ● ● ●
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● ● 8 ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● 8 ●
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● 7 ●



Високоврожайний, за хлібопекарськими властивостями належить до цінної пшениці



Низькорослий, стійкий до вилягання сорт озимої пшениці інтенсивного типу з дуже високим потенціалом урожайності



Характеризується високою зимо- та посухостійкістю



Сорту притаманна висока толерантність до борошнистої роси та бурої іржі

РІЗНОВИДЛЮТЕСЦЕНС (безостий)
ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮКОЛОСОВИЙ
ЗА ХЛІБОПЕКАРНОЮ ЯКІСТЮА
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН45-48 г



СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
3,2-3,8	3,8-4,5	4,5-5,2

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● 8 ●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● 7 ● ●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● 9 ●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● 9 ●
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● ● 8 ●
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● 8 ●
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● 7 ● ●
ПІРЕНОФОРОЗ	● ● ● ● 6 ● ● ●
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● ● 8 ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● 7 ●
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● 8 ●



Чудова озерненість колоса дозволяють отримувати високу масу тисячі насінин та питому вагу зерна



Ранньостиглий сорт, який поєднує в собі високу продуктивність та стійкість до вилягання



Найкраще розкриває потенціал за інтенсивної технології вирощування



Поєднує в собі високу адаптивність до умов вирощування та інтенсивне продуктивне кущення



Завдяки міцному стеблу, толерантний до вилягання

РІЗНОВИДЛЮТЕСЦЕНС (безостий)
ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮКОЛОСОВИЙ
ЗА ХЛІБОПЕКАРНОЮ ЯКІСТЮА
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН46-50 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
2,8-3,2	3,5-4,0	4,5-4,8

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	5
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
ПІРЕНОФОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	6

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9



Чудова стійкість до враження весняними морозами дозволяють безпроблемно пережити складні погодні умови



Середньоранній остистий сорт озимої пшениці, якому притаманна надзвичайна стабільність



Високий вихід борошна хлібопекарської якості



Надзвичайна стійкість до стресових умов



Особливо виражена висока толерантність до борошнистої роси, жовтої та бурої іржі

РІЗНОВИДЕРЕТРОСПЕРМУМ (остистий)
ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮКОЛОСОВИЙ
ЗА ХЛІБОПЕКАРНОЮ ЯКІСТЮЕ
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН42-47 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
3,0-3,5	3,5-4,0	4,0-4,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
ПІРЕНОФОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	6
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8



Невисокорослий сорт для умов дефіциту вологи



Абсолютно стійкий до стресів та посухи, завдяки своїй потужній добре розвиненій кореневій системі, яка наростає завдяки швидким темпам початкового розвитку



Має виражену толерантність до борошнистої роси, фузаріозу колоса та септоріозу

РІЗНОВИД ЕРЕТРОСПЕРМУМ (остистий)
ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЩІЛЬНОКОЛОСОВИЙ
ЗА ХЛІБОПЕКАРНОЮ ЯКІСТЮ Е
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН 45-50 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
3,0-3,5	3,5-4,0	4,0-4,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	6
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
ПІРЕНОФОРОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7



Пластичний до технології вирощування та не вимагає інтенсивного азотного живлення



Сорт для суворих умов вирощування, який вирізняється видатною зимостійкістю



Характеризується високою толерантністю до стресових умов



За надмірного зволоження вимагає використання ріст регуляторів



Має добре озернений колос та високу масу тисячі зерен

РІЗНОВИД ЕРЕТРОСПЕРМУМ (остистий)
ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ
ЗА ХЛІБОПЕКАРНОЮ ЯКІСТЮ В
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН 42-48 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
2,5-3,2	3,2-3,8	3,8-4,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	6

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	6
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	6
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ПІРЕНОФОРОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7



Поєднує високу врожайність якісного зерна з інтенсивним формуванням солом'яної маси, що робить його привабливим для тваринницьких господарств



Відзначається стабільною продуктивністю навіть у складних погодних умовах



Формує добре вирівняне, велике зерно з високими якісними показниками



Висока рослина з потужним стеблом — ідеальна для заготівлі соломи та підстилки



За надмірного зволоження та інтенсивного азотного живлення вимагає використання ріст регуляторів

РІЗНОВИДЛЮТЕСЦЕНС (безостий)
ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ КОЛОСОВИЙ
ЗА ХЛІБОПЕКАРНОЮ ЯКІСТЮ В
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН 44-48 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
2,5-3,2	3,5-3,8	4,2-4,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● 6 ● ● ●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● 6 ● ● ● ●
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ПІРЕНОФОРОЗ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● 9



ТОННАЖ - рекордсмен по врожайності, найкращий вибір для агровиборників, які орієнтуються на максимальну врожайність з гектара



Надзвичайно висока маса тисячі насінин понад 50 г



Мультипридатність до будь-яких умов і ґрунтів



Чудова альтернатива для зниження собівартості для виготовлення кормів



Відмінна здатність до кушення, завдяки якій формується велика кількість продуктивних стебел – це основні переваги сорту

РІЗНОВИДЛЮТЕСЦЕНС (безостий)
ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ
ЗА ХЛІБОПЕКАРНОЮ ЯКІСТЮ С
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН 48-52г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
2,8-3,2	3,2-3,8	3,8-4,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● 8 ●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● 9 ● ●
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● 8 ● ●
ПІРЕНОФОРОЗ	● ● ● ● ● ● ● 7 ● ●
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● 5 ● ● ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● 8 ●
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● 9





Завдяки компенсаційному типу формування врожаю, сорт є гнучким до термінів посіву, та має компенсаційне кушення у весняний період



Хлібна пшениця із високим показником врожайності



Має швидкі початкові темпи розвитку які забезпечують високу продуктивність сорту



Демонструє високу стійкість до вилягання завдяки своїй низькорослості



Відмінний варіант для агровиробників, які орієнтуються на максимальну врожайність з гектара та зерно 2-3 го класу

РІЗНОВИДЛЮТЕСЦЕНС (безостий)
ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮКОМПЕНСАЦІЙНИЙ
ЗА ХЛІБОПЕКАРНОЮ ЯКІСТЮА
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН42-48 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
2,5-3,0	3,2-3,8	4,0-4,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
ПІРЕНОФОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9



Сорт з яскраво вираженою кореневою системою, дуже стійкий до вилягання та посушливих умов



Унікальне поєднання гнучкості строків посіву та врожайності



Остиста пшениця з високою врожайністю та якісними показниками (група Е/А)



Добре адаптується до різних кліматичних та ґрунтових умов



Хороша стійкість до кислотності ґрунту
Високий рівень білка 15-18%, глютену, число падіння, а також хороша стійкість до проростання в колосі

РІЗНОВИДЕРЕТРОСПЕРМУМ (остистий)
ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮКОМПЕНСАЦІЙНИЙ
ЗА ХЛІБОПЕКАРНОЮ ЯКІСТЮЕ
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН42-45 г

ГУСТОТА ПОСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Залежно від термінів посіву/умов зволоження

Осінь (з 20 жовтня)	Весна (до початку квітня)
4,0- 4,5	3,8 – 4,2

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
ПІРЕНОФОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8



Сорт з дуже раннім колосінням, що є перевагою у регіонах із дефіцитом води та швидким настанням високих температур



Характеризується доброю стійкістю до збудників іржі та вірусних хвороб



На добре розвинених посівах за сприятливих умов вирощування рекомендоване внесення ретардантів



Відмінна технологічна якість зерна

РІЗНОВИДЕРЕТРОСПЕРМУМ (остистий)

ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮКОЛОСОВИЙ

МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН46-50 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ(МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
3,2-3,5	3,5-4,2	4,2-4,8

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ 9

ЗИМОСТІЙКІСТЬ 8

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ 8

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ 7

СТІЙКІСТЬ ДО ПРОРОСТАННЯ 8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА 7

ЖОВТА ІРЖА 8

БУРА ІРЖА 6

СЕПТОРІОЗ 7

ПІРЕНОФОРІОЗ 7

ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ 8

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ 8

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ 7

ЯКІСТЬ

Вихід крупи	Вміст жовтого пігменту	Склоподібність	Натура	Вміст білку
8	4	7	8	5



Має велике зерно з дуже високою натурою та вмістом клейковини. Дуже високий вихід крупи, завдяки чому є цікавим для виробництва макаронів



Поєднує в собі найвищі врожаї - особливо за умов інтенсивної технології



Формує урожай з чудовими якісними показниками



Раннє настання фази колосіння та середньораннє дозрівання

РІЗНОВИДЕРЕТРОСПЕРМУМ (остистий)

ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮКОЛОСОВИЙ

МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН48-56 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
(МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
3,2-3,8	3,8-4,5	4,5-5,2

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ 8

ЗИМОСТІЙКІСТЬ 8

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ 8

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ 9

СТІЙКІСТЬ ДО ПРОРОСТАННЯ 7

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА 9

ЖОВТА ІРЖА 8

БУРА ІРЖА 9

СЕПТОРІОЗ 7

ПІРЕНОФОРІОЗ 7

ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ 7

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ 7

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ 7

ЯКІСТЬ

Вихід крупи	Вміст жовтого пігменту	Склоподібність	Натура	Вміст білку
8	3	7	6	7



Демонструє добру стійкість до вірусу карликовості пшениці, а також розвинену стійкість до борошнистої роси та фузаріозу колоса



Його головна перевага — поєднання високої врожайності та відмінної якості зерна



Сорт вирізняється чудовими показниками склоподібності, виходу крупи та вмісту жовтого пігменту

РІЗНОВИДЕРЕТРОСПЕРМУМ (остистий)
ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮКОЛОСОВИЙ
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН 51-58 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
3,2-3,5	3,5-4,2	4,2-4,8

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● 9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● 7
СТІЙКІСТЬ ДО ПРОРОСТАННЯ	● ● ● ● ● ● 8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● 7
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● 5
БУРА ІРЖА	● ● ● ● 5
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● 7
ПІРЕНОФОРОЗ	● ● ● ● ● 7
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● 7

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● 8
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● 7

ЯКІСТЬ

Вихід крупи	Вміст жовтого пігменту	Склоподібність	Натура	Вміст білку
7	5	7	7	6



Сорт має добру стійкість до основних хвороб: бура листова іржа та жовта листова іржа



Один із лідерів у вирощуванні за органічної технології



Відмінна зимостійкість



Дуже високий вміст білка та клейковини



Надзвичайно витривалий сорт який має дуже потужне кущення



Має покращені показники числа падіння

РІЗНОВИДЛЮТЕСЦЕНС (безостий)
МАСА ТИСЯЧІ КОЛОСКІВ 120-125 г
ВМІСТ БІЛКА 16-19%
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ 29-36%

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.КОЛОСКІВ/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
1,1-1,3	1,3-1,5	1,5-1,7

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● 8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● 8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● 6
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● 8
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● 8
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● 7
ПІРЕНОФОРОЗ	● ● ● ● ● 6
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● 7

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● 8
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● 8





Високопродуктивна спелта з винятковими технологічними якостями для випічки



Забезпечує стабільний валовий збір навіть у складних умовах



Підвищена стійкість до вилягання



Високі хлібопекарські властивості, зокрема підвищене водопоглинання та еластичність тіста, які суттєво переважають характеристики інших сортів

РІЗНОВИДЛЮТЕСЦЕНС (безостий)
МАСА ТИСЯЧІ КОЛОСКІВ 120-125 г
ВМІСТ БІЛКА 16-19%
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ 29-36%

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.КОЛОСКІВ/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
1,0-1,2	1,2-1,4	1,5-1,7

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 8

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● 6
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● 8
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● 8
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● 7
ПІРЕНОФОРІОЗ	● ● ● ● ● 6
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● 7

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● 9



Його сильні сторони полягають у високій стійкості до хвороб, а саме до бурої іржі, жовтої іржі, септоріозу та борошнистої роси



Поєднує в собі три видатні характеристики: високоврожайний, низькорослий і має найвищу натуру зерна



Коротка висота рослин забезпечує бездоганну стійкість до вилягання



Трібонус підходить для виробництва біоетанолу



Демонструє рекордні показники урожайності у зволжених регіонах

РІЗНОВИДЕРЕТРОСПЕРМУМ (остистий)
ТИП ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ
НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВИЙ
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН 50-58 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
2,2-2,8	2,8-3,5	3,5-4,0

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● 8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	● ● ● ● ● ● ● ● 8
ЖОВТА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● 9
БУРА ІРЖА	● ● ● ● ● ● ● ● 9
СЕПТОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
ПІРЕНОФОРІОЗ	● ● ● ● ● ● ● ● 7
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ	● ● ● ● ● ● ● ● 7





РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● 8
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ● 9

... дуже погано, дуже пізно, дуже довго, дуже вразливі 9 ... дуже добре, дуже рано, дуже короткий, дуже стійкі

NEW

АДАЛІНА



ТИП КОЛОСУ.....	ПАЛІДУМ (шестирядний)
КОЛОСІННЯ	РАННЄ
НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ	ЗЕРНОВИЙ
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН	52-60 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
2,0-2,5	2,5-3,0	3,0-3,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	●	●	●	●	●	●	●	9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	●	●	●	●	●	●	●	8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	●	●	●	●	●	●	●	8
СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ СТЕБЛА	●	●	●	●	●	●	●	8
СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ КОЛОСА	●	●	●	●	●	●	●	8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	●	●	●	●	●	●	●	8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	7
ВІРУС ЖОВТОЇ КАРЛИКОВСТІ	9
СІТЧАСТА ПЛЯМИСТІСТЬ	8
РИНХОСПОРІОЗ	7
РАМУЛЯРІОЗ	8
БУРА ІРЖА	7

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ●	9
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ●	8



Ячмінь озимий середньоранній



**Потужне кущення та висока маса
тисячі насінин**



Висока стійкість до ламкості стебла та колосу



Характеризується високою зимо- та посухостійкістю



Підвищено стійкий до ураження гельмінтоспориозом та борошнистою росою



**Має надзвичайну стійкість до умов дефіциту
вологи**



Висока стійкість до основних хвороб

ТИП КОЛОСУ.....	НУТАНС (дворянний)
КОЛОСІННЯ	СЕРЕДНЬОПІЗНЄ
НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ.....	ФУРАЖНИЙ
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН	55-62 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
1,5-2,2	2,2-2,8	2,8-3,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	●	●	●	●	●	●	●	●	9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	●	●	●	●	●	●	●	8	●
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	●	●	●	●	●	●	●	8	●
СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ СТЕБЛА	●	●	●	●	●	7	●	●	●
СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ КОЛОСА	●	●	●	●	●	●	●	9	●
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	●	●	●	●	●	●	8	●	●

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	●	●	●	●	●	●	●	8
ВІРУС ЖОВТОЇ КАРЛИКОВОСТІ	●	●	●	●	●	●	●	8
СІТЧАСТА ПЛЯМИСТИСТЬ	●	●	●	●	●	●	●	8
РИНХОСПОРІОЗ	●	●	●	●	●	7	●	7
РАМУЛЯРІОЗ	●	●	●	●	●	●	●	8
БУРА ІРЖА	●	●	●	●	●	●	●	9

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ●	9
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ.....	● ● ● ● ● ● ● ●	8

Ячмінь озимий середньоранній

ФІНОЛА



Швидкі темпи осіннього розвитку роблять його універсальним по термінах посіву



Відновлення весняної вегетації проходить швидко і має раннє колосіння



Дуже ефективно використовує раньовесняну вологу



Гарна стійкість до вилягання та відмінна стійкість до ламкості стебла

ТИП КОЛОСУ.....	ПАЛІДУМ (шестирядний)
КОЛОСІННЯ	ДУЖЕ РАННЄ
НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ.....	ФУРАЖНИЙ
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН	48-50 г



СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
2,0-2,5	2,5-3,0	3,2-3,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	●●●●●●●●	8
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	●●●●●●●●	8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	●●●●●●●●	7
СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ СТЕБЛА	●●●●●●●●	8
СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ КОЛОСА	●●●●●●●●	7
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	●●●●●●●●	8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

[illegible]

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ●	8
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ.....	● ● ● ● ● ● ●	8



Вирізняється високою стійкістю до хвороб, зокрема до борошнистої роси та сітчастої плямистості



Адаптивність до різних термінів посіву



Компенсаційна здатність за зріджених посівів



Придатний для пізніх термінів посіву за рахунок швидких темпів розвитку



Висока посухостійкість протягом усього періоду вегетації



Відмінно відчуває себе у добре зволжених регіонах

ТИП КОЛОСУ.....	ПАЛІДУМ (шестирядний)
КОЛОСІННЯ	СЕРЕДНЬОПІЗНЄ
НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ.....	ЗЕРНОВИЙ
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН	52-60 г

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
2,0-2,5	2,5-3,0	3,0-3,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	9
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ СТЕБЛА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ КОЛОСА	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	●	●	●	●	●	●	8	
ВІРУС ЖОВТОЇ КАРЛИКОВОСТІ	●	●	●	●	●	7	●	●
СІТЧАСТА ПЛЯМИСТІСТЬ	●	●	●	●	●	8	●	●
РИНХОСПОРІОЗ	●	●	●	●	●	8	●	●
РАМУЛЯРІОЗ	●	●	●	●	●	7	●	●
БУРА ІРЖА	●	●	●	●	●	7	●	●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● ● ●	9
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ.....	● ● ● ● ● ● ● ●	8



Адаптується до різноманітних погодних умов та різних елементів технології вирощування



Сорт з високою толерантністю до вилягання і ламкості стебла



Характеризується чудовою крупністю і нату-
рою зерна та високою кормовою цінністю



**Має стримані темпи початкового розвитку
восени та швидко відновлення на весні**

ТИП КОЛОСУ.....	НУТАНС (дворянний)
КОЛОСІННЯ	РАННЄ
НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ.....	ФУРАЖНИЙ
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН	52-58 г



СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ (МЛН.СХ.НАС/ГА)

Ранній	Оптимальний	Пізній
2,0-2,5	2,5-3,2	3,2-3,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ	● ● ● ● ● ● ● ●	8
ЗИМОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ●	8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	● ● ● ● ● ● ● ●	7
СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ СТЕБЛА	● ● ● ● ● ● ● ●	8
СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ КОЛОСА	● ● ● ● ● ● ● ●	9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	● ● ● ● ● ● ● ●	8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БОРОШНИСТА РОСА	●	●	●	●	●	6	●	●	●
ВІРУС ЖОВТОЇ КАРЛИКОВОСТІ	●	●	●	●	●	6	●	8	●
СІТЧАСТА ПЛЯМИСТІСТЬ	●	●	●	●	●	6	●	●	●
РИНХОСПОРІОЗ	●	●	●	●	●	7	●	●	●
РАМУЛЯРІОЗ	●	●	●	●	●	7	●	●	●
БУРА ІРЖА	●	●	●	●	●	7	●	●	●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ	● ● ● ● ● ● 7 ● ●
УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ.....	● ● ● ● ● ● ● 9



Пивоварний сорт з високою толерантністю до ламкості стебла та колосу



У якісному відношенні вражає за важливими параметрами та відмінної якості солоду



Вирізняється високою толерантністю до борошнистої роси



Демонструє стабільні показники урожайності як у засушливих так і зволжених регіонах



Має стримані темпи початкового розвитку
восени та швидко відновлення на весні

ТИП КОЛОСУ.....	НУТАНС (дворянний)
КОЛОСІННЯ	ПІЗНЄ
НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ.....	ПІВОВАРНИЙ
МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН	53-57 г

Ранній	Оптимальний	Пізній
2,5-2,8	2,8-3,2	3,2-3,5

ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ..... 8

ЗИМОСТІЙКІСТЬ 

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

СТІЙКІСТЬ ДО БАКІЯКІСТІ СТЕБЛА

СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ СТЕБЛА 9

СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ КОЛОСА ● ● ● ● ● ● ● ● 9

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ ● ● ● ● ● ● 7 ● ●

ВІРУС ЖОВТОЇ МОЗАЇКИ ЯЧМЕНЮ ● ● ● ● ● ● ● ● 9

БОРОШНИСТА РОСА 8

ВІРУС ЖОВТОЇ КАРЛИКОВОСТІ	5
---------------------------------	---

СІТЧАСТА ПЛЯМИСТІСТЬ..... 6

ВИНУОСПОВІОЗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

РАМУЛЯРІОЗ..... 5


БУРА ІРЖА ● ● ● ● ● ● 7 ● ●

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗАСУШЛИВИХ УМОВАХ 8

УРОЖАЙНІСТЬ В ЗВОЛОЖЕНИХ УМОВАХ

7. ОБЪЕДИНЕНИЕ В СВОБОДНОМЫХ ГРУППАХ..... 9

ШУКАЙТЕ НАС





ТОВ «ЗАТБАУ ПРОБСТДОРФЕР УКРАЇНА»
02132 Київ, вул. Дніпровська набережна, 26 Ж, оф. 29-32
Tel: +38 044 227 85 80
<https://www.sb-ps-ua.com>
<https://www.facebook.com/saatbau.probstdorfer.ukraine>